

Markies.

Een laat, hoogopbrengend aardappelras voor verwerking, geschikt voor frites, fastfoodindustrie, chips en verse consumptie.



**Verwerkende
industrie**

Frites
Chips



Traditioneel

- ▶ **Grove knollen**
- ▶ **Brede virusresistenties**
- ▶ **Goede bewaarbaarheid**



characteristics

Algemene kenmerken

Kweker: Dr. R.J. Mansholt's Veredelingsbedrijf B.V.
Kruising: FIANNA x AGRIA
Kwekersrecht: 31-12-2029
Zaailing: MA 85-0698

Plant- en knoleigenschappen

Rijptijd: laat / 4
Kiemkleur: blauw paars / BV
Bloemkleur: wit / W
Hoeveelheid bessen: benedengemiddeld / 6,5
Loof - ontwikkeling begin: vrij snel / 7
Loof - ontwikkeling volledig: goed / 8
Loof - stevigheid plant: stevig / 8
Schilkleur: geel / Y
Vleeskleur: lichtgeel / 6,5
Schilhoedanigheid: goed / 7
Knolvorm: ovaal lang / OL
Regelmaat knolvorm: regelmatig / 7
Knolzetting: gemiddeld / 6
Knolgrootte: vrij grof / 7,5
Regelmaat sortering: regelmatig / 7
Kiemrust: gemiddeld / 6,5

Gevoeligheid en kwaliteit

Doorwas: redelijk gevoelig / 6
Blauwgevoeligheid: weinig tot niet gevoelig / 8
Groeischeuren: weinig gevoelig / 7
Roibeschatiging: gevoelig / 5
Ethyleen: 5% tot 15% meer knollen / 6
Talent: 15% tot 25% meer knollen / 7
Onderwatergewicht: 427
Drogestofgehalte: 22,8%
Kooktype: kruimig / BC
Grauwverkleuring (na koken): redelijk gevoelig / 6
Rauwverkleuring: weinig gevoelig / 7
Frietkwaliteit: uitstekend / 8
Drogestofverdeling: goed / 7,5
Chipskwaliteit: goed / 7
TGA-gehalte: 3,4

How to grow



www.agricopotatoes.nl

Teeltadvies ¹

Stikstof: standaard advies - 10%. Bij voorkeur opdelen in 3 giften. De tweede gift kort na knolzetting.

Fosfaat: standaard advies.

Kalium: standaard advies + 10%.

Pootgoedbehandeling

Goed voorkiemen na het verwijderen van de topspruit kan een positief resultaat geven op de knolzetting. Eén keer afkiemen is optioneel.

Planting distance

28/35 mm: 27 cm (50.000 planten/ha)

35/55 mm: 33 cm (40.000 planten/ha)

50/55 mm: 40 cm (33.000 planten/ha)

Onkruiden

Een standaard dosering Metribuzin (Sencor) vóór en na opkomst kan enige reactie in het loof veroorzaken maar geeft zelden opbrengstderving.

Schimmels

Een strikt preventief spuitschema wordt geadviseerd.

Oogst

Wacht tenminste drie weken na loofdding, vanwege de gevoeligheid voor rooibeschatiging en/of stootblauw.

Bewaartemperatuur - Bewaarperiode

Geadviseerde bewaartemperatuur is 5 °C. Voor verwerkingsdoeleinden niet kouder bewaren dan 7 °C. Geschikt voor middellange bewaring.

¹ Bemestingsadvies is gebaseerd op bodemanalyse



Say potato,
say Agrico.

Resistenties

Virus - Bladrol: weinig vatbaar / 7

Virus - Yn: weinig vatbaar / 7,5

Virus - Yntn (knol): weinig vatbaar / 7

Kringerigheid: zeer vatbaar / 4

Phytophthora loof: weinig vatbaar / 6,5

Phytophthora knol: weinig vatbaar / 7

Fusarium: weinig tot niet vatbaar / 8

Schurft: vatbaar / 5

Poederschurft: zeer vatbaar / 3,5

Zwarte spikkel: - / -

Wrastziekte F1 (D1): - / -

Wrastziekte F6 (O1): matig vatbaar / 5

Wrastziekte F18 (T1): - / -

Aardappelmoetheid Ro 1/4 (A): resistent / 9

Aardappelmoetheid Ro 2/3 (B/C): - / -

Aardappelmoetheid Pa 2 (D): - / -

Aardappelmoetheid Pa 3 (E): - / -