

Melrose.

Een middenlaat rijpende tafelaardappel met een krachtige aardappelsmaak en veelzijdig in gebruik.



**Verwerkende
industrie**
Koelvers



**Retail
Vers
Speciaal**

- ▶ **Vrij kruimig**
- ▶ **Gele vleeskleur**
- ▶ **Lichtrode schilkleur**



characteristics

Algemene kenmerken

Kweker: C.R.A.

Kruising: BP 15.7.70 x AM 15.1.68

Kwekersrecht: 31-12-2042

Zaailing: ISCI 12/01-5

Plant- en knoleigenschappen

Rijptijd: middenlaat / 6

Kiemkleur: - / -

Bloemkleur: wit / W

Hoeveelheid bessen: - / -

Loof - ontwikkeling begin: gemiddeld / 6,5

Loof - ontwikkeling volledig: vrij goed / 7,5

Loof - stevigheid plant: vrij stevig / 7

Schilkleur: rood / R

Vleeskleur: geel / 7

Schilhoedanigheid: bovengemiddeld / 6,5

Knolvorm: ovaal / O

Regelmaat knolvorm: regelmatig / 7

Knolzetting: hoog / 8

Knolgrootte: vrij grof / 7

Regelmaat sortering: vrij regelmatig / 6

Kiemrust: gemiddeld / 6

Gevoeligheid en kwaliteit

Doorwas: weinig gevoelig / 7

Blauwgevoeligheid: redelijk gevoelig / 6

Groeischeuren: weinig gevoelig / 7

Roibeschatting: weinig gevoelig / 7

Ethyleen: - / -

Talent: 5% minder knollen / 4

Onderwatergewicht: 406

Drogestofgehalte: 22%

Kooktype: vrij kruimig / B

Grauwverkleuring (na koken): redelijk gevoelig / 6,5

Rauwverkleuring: zeer gevoelig / 4,5

Frietkwaliteit: bovengemiddeld / 6,5

Drogestofverdeling: - / -

Chipskwaliteit: niet geschikt / 5

TGA-gehalte: 9,5

How to grow



www.agricopotatoes.nl

Teeltadvies ¹

Stikstof: standaard advies.

Fosfaat: standaard advies.

Kalium: standaard advies + 10%.

Pootgoedbehandeling

Een korte warmtestoot of goed voorkiemen wordt aanbevolen. Meer dan eens afkiemen kan een negatief effect hebben op de opbrengst en uniformiteit van de sortering.

Planting distance

28/35 mm: 20 cm (67.000 planten/ha)

35/50 mm: 25 cm (54.000 planten/ha)

Onkruiden

Een standaard dosering Metribuzin (Sencor) vóór en na opkomst geeft geen loof reactie of opbrengstderving.

Schimmels

Een strikt preventief spuitschema is noodzakelijk.

Oogst

Wacht tenminste twee weken na loofdoding, vanwege de gevoeligheid voor rooibeschatiging en/of stootblauw.

Bewaartemperatuur - Bewaarperiode

Geadviseerde bewaartemperatuur is 5 °C. Geschikt voor middellange bewaring.

¹ Bemestingsadvies is gebaseerd op bodemanalyse



Resistenties

Virus - Bladrol: - / -

Virus - Yn: weinig tot niet vatbaar / 8

Virus - Yntn (knol): weinig tot niet vatbaar / 8

Kringrigheid: - / -

Phytophthora loof: zeer vatbaar / 4

Phytophthora knol: - / -

Fusarium: - / -

Schurft: weinig vatbaar / 6

Say potato,
say Agrico.

Poederschurft: - / -

Zwarte spikkel: - / -

Wratziekte F1 (D1): licht vatbaar / 7

Wratziekte F6 (O1): - / -

Wratziekte F18 (T1): - / -

Aardappelmoetheid Ro 1/4 (A): - / -

Aardappelmoetheid Ro 2/3 (B/C): - / -

Aardappelmoetheid Pa 2 (D): - / -

Aardappelmoetheid Pa 3 (E): - / -