TEELTAANBEVELING

Melrose.

Een middenlaat rijpende tafelaardappel met een krachtige aardappelsmaak en veelzijdig in gebruik.

Verwerkende industrie
Koelvers

Retail
Vers
Speciaal

- **Vrij kruimig**
- **Gele vleeskleur**
- **Lichtrode schilkleur**



Karakteristieken

Algemene kenmerken

Kweker: C.R.A.
Kruising: BP 15.7.70 x AM 15.1.68
Kwekersrecht: 31-12-2042
Zaailing: ISCI 12/01-5

Plant- en knoleigenschappen

Rijptijd: middenlaat / 6
Kiemkleur: - / -
Bloemkleur: wit / W
Hoeveelheid bessen: - / -
Loof - ontwikkeling begin: gemiddeld / 6,5
Loof - ontwikkeling volledig: vrij goed / 7,5
Loof - stevigheid plant: vrij stevig / 7
Schilkleur: rood / R
Vleeskleur: geel / 7
Schilhoedanigheid: bovengemiddeld / 6,5
Knolvorm: ovaal / O
Regelmaat knolvorm: regelmatig / 7
Knolzetting: hoog / 8
Knolgrootte: vrij grof / 7
Regelmaat sortering: vrij regelmatig / 6
Kiemrust: gemiddeld / 6

Gevoeligheid en kwaliteit

Doorwas: weinig gevoelig / 7
Blauwgevoeligheid: redelijk gevoelig / 6
Groeischeuren: weinig gevoelig / 7
Rooibeschadiging: weinig gevoelig / 7
Ethyleen: - / -
Talent: 5% minder knollen / 4
Onderwatergewicht: 406
Drogestofgehalte: 22%
Kooktype: vrij kruimig / B
Grauwverkleuring (na koken): redelijk gevoelig / 6,5
Rauwverkleuring: zeer gevoelig / 4,5
Frietkwaliteit: bovengemiddeld / 6,5
Drogestofverdeling: - / -
Chipskwaliteit: niet geschikt / 5
TGA-gehalte (mg/100 gr): 9,5 mg/100g

Agrico stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele schadelijke gevolgen die kunnen ontstaan bij het gebruik maken van de gegevens.

AGRICO

TEELTAANBEVELING

Teeltadvies

www.agricopotatoes.nl

Teeltadvies [1]

Stikstof: standaard advies.
Fosfaat: standaard advies.
Kalium: standaard advies + 10%.

Pootgoedbehandeling

Een korte warmtestoot of goed voorkiemen wordt aanbevolen.Meer dan eens afkiemen kan een negatief effect hebben op de opbrengst en uniformiteit van de sortering.

Plantafstand

28/35 mm: 20 cm (67.000 planten/ha)
35/50 mm: 25 cm (54.000 planten/ha)

Schimmels

Een strikt preventief spuitschema is noodzakelijk.

Oogst

Wacht tenminste twee weken na loofdoding, vanwege de gevoeligheid voor rooibeschadiging en/of stootblauw.

Bewaartemperatuur - Bewaarperiode

Geadviseerde bewaartemperatuur is 5 °C. Geschikt voor middellange bewaring.

[1] Bemestingsadvies is gebaseerd op bodemanalyse



Say potato, say Agrico.

Resistenties

Virus - Bladrol: - / -
Virus - Yn: weinig tot niet vatbaar / 8
Virus - Yntn (knol): weinig tot niet vatbaar / 8
Kringerigheid: - / -
Phytophthora loof: zeer vatbaar / 4
Phytophthora knol: - / -
Fusarium: - / -
Schurft: weinig vatbaar / 6
Poederschurft: - / -
Zwarte spikkel: - / -
Wratziekte F1 (D1): licht vatbaar / 7
Wratziekte F6 (O1): - / -
Wratziekte F18 (T1): - / -
Aardappelmoeheid Ro 1/4 (A): - / -
Aardappelmoeheid Ro 2/3 (B/C): - / -
Aardappelmoeheid Pa 2 (D): - / -
Aardappelmoeheid Pa 3 (E): - / -

Agrico • Duit 15 • 8305 BB Emmeloord +31 (0)527 639911 info@agrico.nl agricopotatoes.nl