TEELTAANBEVELING

Meryem.

Een laatrijpend, hoogopbrengend aardappelras met een opvallend mooie rode schil.

Traditioneel



- **Prachtige rode schil**
- **Hoge opbrengst**
- **Uniforme sortering**
- **Sterk loof**
- **Grote knollen**

Karakteristieken

Algemene kenmerken

Kweker: Agrico Research B.V.
Kruising: LUSA x AR 01-0420
Kwekersrecht: 31-12-2049
Zaailing: AR 08-4009

Plant- en knoleigenschappen

Rijptijd: laat / 5
Kiemkleur: rood paars / RV
Bloemkleur: licht paars / LP
Hoeveelheid bessen: benedengemiddeld / 6,5
Loof - ontwikkeling begin: snel / 8
Loof - ontwikkeling volledig: goed / 8
Loof - stevigheid plant: vrij stevig / 7,5
Schilkleur: rood / R
Vleeskleur: lichtgeel / 6,5
Schilhoedanigheid: zeer goed / 7,5
Knolvorm: lang ovaal / LO
Regelmaat knolvorm: vrij regelmatig / 6,5
Knolzetting: vrij hoog / 7
Knolgrootte: vrij grof / 7,5
Regelmaat sortering: vrij regelmatig / 6,5
Kiemrust: kort / 4

Gevoeligheid en kwaliteit

Doorwas: redelijk gevoelig / 6,5
Blauwgevoeligheid: weinig gevoelig / 7
Groeischeuren: weinig gevoelig / 7
Rooibeschadiging: redelijk gevoelig / 6
Ethyleen: 5% tot 15% meer knollen / 6
Talent: 5% minder knollen / 4
Onderwatergewicht: 349
Drogestofgehalte: 19,2%
Kooktype: vrij kruimig / B
Grauwverkleuring (na koken): redelijk gevoelig / 6,5
Rauwverkleuring: - / -
Frietkwaliteit: benedengemiddeld / 5,5
Drogestofverdeling: - / -
Chipskwaliteit: niet geschikt / 4
TGA-gehalte (mg/100 gr): 3,3 mg/100g

Agrico stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele schadelijke gevolgen die kunnen ontstaan bij het gebruik maken van de gegevens.

AGRICO

TEELTAANBEVELING

Teeltadvies

www.agricopotatoes.nl

Teeltadvies [1]

Stikstof: standaard advies.
Fosfaat: standaard advies.
Kalium: standaard advies + 20%.

Pootgoedbehandeling

Kan direct uit de koelcel geplant worden, bij voorkeur na een korte warmtestoot.Meer dan eens afkiemen kan een negatief effect hebben op de opbrengst en uniformiteit van de sortering.

Plantafstand

28/35 mm: 25 cm (54.000 planten/ha)
35/55 mm: 35 cm (38.000 planten/ha)

Schimmels

Een strikt preventief spuitschema is noodzakelijk.

Oogst

Wacht tenminste twee weken na loofdoding, vanwege de gevoeligheid voor rooibeschadiging en/of stootblauw.

Bewaartemperatuur - Bewaarperiode

Geadviseerde bewaartemperatuur is 5 °C. Geschikt voor korte tot middellange bewaring.

[1] Bemestingsadvies is gebaseerd op bodemanalyse



Say potato, say Agrico.

Resistenties

Virus - Bladrol: - / -
Virus - Yn: weinig vatbaar / 6,5
Virus - Yntn (knol): weinig vatbaar / 7,5
Kringerigheid: weinig tot niet vatbaar / 9
Phytophthora loof: zeer vatbaar / 4,5
Phytophthora knol: weinig vatbaar / 6
Fusarium: vatbaar / 5
Schurft: vatbaar / 5,5
Poederschurft: weinig vatbaar / 6
Zwarte spikkel: weinig tot niet vatbaar / 8
Wratziekte F1 (D1): resistent / 10
Wratziekte F6 (O1): weinig vatbaar / 9
Wratziekte F18 (T1): - / -
Aardappelmoeheid Ro 1/4 (A): - / -
Aardappelmoeheid Ro 2/3 (B/C): - / -
Aardappelmoeheid Pa 2 (D): - / -
Aardappelmoeheid Pa 3 (E): - / -

Agrico • Duit 15 • 8305 BB Emmeloord +31 (0)527 639911 info@agrico.nl agricopotatoes.nl