

# Meryem.



Traditioneel

Een laatrijpend, hoogopbrengend aardappelras met een opvallend mooie rode schil.

- ▶ **Prachtige rode schil**
- ▶ **Hoge opbrengst**
- ▶ **Uniforme sortering**
- ▶ **Sterk loof**
- ▶ **Grote knollen**



## characteristics

### Algemene kenmerken

Kweker: Agrico Research B.V.  
 Kruising: LUSA x AR 01-0420  
 Kwekersrecht: 31-12-2049  
 Zaailing: AR 08-4009

### Plant- en knoleigenschappen

Rijptijd: laat / 5  
 Kiemkleur: rood paars / RV  
 Bloemkleur: licht paars / LP  
 Hoeveelheid bessen: benedengemiddeld / 6,5  
 Loof - ontwikkeling begin: snel / 8  
 Loof - ontwikkeling volledig: goed / 8  
 Loof - stevigheid plant: vrij stevig / 7,5  
 Schilkleur: rood / R  
 Vleeskleur: lichtgeel / 6,5  
 Schilhoedanigheid: bovengemiddeld / 6,5  
 Knolvorm: lang ovaal / LO  
 Regelmaat knolvorm: vrij regelmatig / 6,5  
 Knolzetting: vrij hoog / 7  
 Knolgrootte: vrij grof / 7,5  
 Regelmaat sortering: vrij regelmatig / 6,5  
 Kiemrust: kort / 4

### Gevoeligheid en kwaliteit

Doorwas: redelijk gevoelig / 6,5  
 Blauwgevoeligheid: weinig gevoelig / 7  
 Groeischeuren: weinig gevoelig / 7  
 Rooibeschaaging: redelijk gevoelig / 6  
 Ethyleen: 5% tot 15% meer knollen / 6  
 Talent: 5% minder knollen / 4  
 Onderwatergewicht: 349  
 Drogestofgehalte: 19,2%  
 Kooktype: vrij kruimig / B  
 Grauwverkleuring (na koken): redelijk gevoelig / 6,5  
 Rauwverkleuring: - / -  
 Frietkwaliteit: benedengemiddeld / 5,5  
 Drogestofverdeling: - / -  
 Chipskwaliteit: niet geschikt / 4  
 TGA-gehalte: 3,3

# How to grow



[www.agricopotatoes.com](http://www.agricopotatoes.com)

## Teeltadvies <sup>1</sup>

Stikstof: standaard advies.  
Fosfaat: standaard advies.  
Kalium: standaard advies + 20%.

## Pootgoedbehandeling

Kan direct uit de koelcel geplant worden, bij voorkeur na een korte warmtestoot. Meer dan eens afkiemen kan een negatief effect hebben op de opbrengst en uniformiteit van de sortering.

## Planting distance

28/35 mm: 25 cm (54.000 planten/ha)  
35/55 mm: 30 cm (45.000 planten/ha)

## Onkruiden

Een standaard dosering Metribuzin (Sencor) vóór en na opkomst geeft geen loof reactie of opbrengstderving.

## Schimmels

Een strikt preventief spuitschema is noodzakelijk.

## Oogst

Wacht tenminste twee weken na loofdoding, vanwege de gevoeligheid voor rooibeschatiging en/of stootblauw.

## Bewaartemperatuur - Bewaarperiode

Geadviseerde bewaartemperatuur is 5 °C. Geschikt voor korte tot middellange bewaring.

<sup>1</sup> Bemestingsadvies is gebaseerd op bodemanalyse



Say potato,  
say Agrico.

## Resistenties

Virus - Bladrol: - / -  
Virus - Yn: weinig vatbaar / 6,5  
Virus - Yntn (knol): weinig vatbaar / 7,5  
Kringrigheid: weinig tot niet vatbaar / 9  
Phytophthora loof: zeer vatbaar / 4,5  
Phytophthora knol: weinig vatbaar / 6  
Fusarium: vatbaar / 5  
Schurft: vatbaar / 5,5

Poederschurft: weinig vatbaar / 6  
Zwarte spikkel: weinig tot niet vatbaar / 8  
Wratziekte F1 (D1): resistent / 10  
Wratziekte F6 (O1): weinig vatbaar / 9  
Wratziekte F18 (T1): - / -  
Aardappelmoetheid Ro 1/4 (A): - / -  
Aardappelmoetheid Ro 2/3 (B/C): - / -  
Aardappelmoetheid Pa 2 (D): - / -  
Aardappelmoetheid Pa 3 (E): - / -