

# Milva.

Een laat aardappelras voor consumptie met een uitstekende schurftresistentie en een zeer hoge opbrengst.



**Retail**  
Vers

- ▶ **Vrij vastkokend**
- ▶ **Grove knollen**
- ▶ **Hoge knolzetting**



## KARAKTERISTIEKEN

### Algemene kenmerken

**Kweker:** Saatzucht Berding  
**Kruising:** NENA x DUNJA  
**Kwekersrecht:** 31-12-2028  
**Zaailing:** NKG 86-1158

### Plant- en knoleigenschappen

**Rijptijd:** laat / 5  
**Kiemkleur:** blauw paars / BV  
**Bloemkleur:** wit / W  
**Hoeveelheid bessen:** zeer veel / 4  
**Loof - ontwikkeling begin:** vrij snel / 7  
**Loof - ontwikkeling volledig:** goed / 8  
**Loof - stevigheid plant:** vrij stevig / 7  
**Schilkleur:** geel / Y  
**Vleeskleur:** geel / 7  
**Schilhoedanigheid:** goed / 7  
**Knolvorm:** ovaal / O  
**Regelmaat knolvorm:** vrij onregelmatig / 5  
**Knolzetting:** hoog / 8  
**Knalgrootte:** vrij grof / 7,5  
**Regelmaat sortering:** vrij regelmatig / 6,5  
**Kiemrust:** gemiddeld / 6

### Gevoeligheid en kwaliteit

**Doorwas:** redelijk gevoelig / 6  
**Blauwgevoeligheid:** weinig gevoelig / 7  
**Groeischeuren:** redelijk gevoelig / 6  
**Roibeschatiging:** gevoelig / 5  
**Ethyleen:** - / -  
**Talent:** - / -  
**Onderwatergewicht:** 380  
**Drogestofgehalte:** 20,7%  
**Kooktype:** vrij kruimig / B  
**Grauwverkleuring (na koken):** redelijk gevoelig / 6,5  
**Rauwverkleuring:** redelijk gevoelig / 6,5  
**Frietkwaliteit:** niet geschikt / 4  
**Drogestofverdeling:** - / -  
**Chipskwaliteit:** niet geschikt / 4  
**TGA-gehalte:** 2,4

# TEELTADVIES



[www.agricopotatoes.nl](http://www.agricopotatoes.nl)

## Teeltadvies <sup>1</sup>

Stikstof: standaard advies + 10%.

Fosfaat: standaard advies.

Kalium: standaard advies.

## Pootgoedbehandeling

Goed voorkiemen na het verwijderen van de topspruit kan een positief resultaat geven op de knolzetting. Meer dan eens afkiemen kan een negatief effect hebben op de opbrengst en uniformiteit van de sortering.

## Plantafstand

28/35 mm: 20 cm (67.000 planten/ha)

35/50 mm: 25 cm (54.000 planten/ha)

## Onkruiden

Een standaard dosering Metribuzin (Sencor) vóór en na opkomst geeft geen loof reactie of opbrengstderving.

## Schimmels

Een strikt preventief spuitschema is noodzakelijk.

## Oogst

Wacht tenminste twee weken na loofdoding, vanwege de gevoeligheid voor rooibeschatiging en/of stootblauw.

## Bewaartemperatuur - Bewaarperiode

Geadviseerde bewaartemperatuur is 5 °C. Geschikt voor middellange bewaring.

<sup>1</sup> Bemestingsadvies is gebaseerd op bodemanalyse



Say potato,  
say Agrico.

## Resistenties

Virus - Bladrol: weinig vatbaar / 7

Virus - Yn: weinig vatbaar / 6

Virus - Yntn (knol): weinig vatbaar / 6

Kringerigheid: vatbaar / 5

Phytophthora loof: zeer vatbaar / 4,5

Phytophthora knol: weinig vatbaar / 6

Fusarium: vatbaar / 5

Schurft: weinig vatbaar / 7

Poederschurft: weinig vatbaar / 6

Zwarte spikkel: - / -

Wratziekte F1 (D1): - / -

Wratziekte F6 (O1): - / -

Wratziekte F18 (T1): - / -

Aardappelmoetheid Ro 1/4 (A): resistent / 9

Aardappelmoetheid Ro 2/3 (B/C): - / -

Aardappelmoetheid Pa 2 (D): - / -

Aardappelmoetheid Pa 3 (E): - / -