

Milva.

Een laat aardappelras voor consumptie met een uitstekende schurftresistentie en een zeer hoge opbrengst.



Retail
Vers

- ▶ **Vrij vastkokend**
- ▶ **Grove knollen**
- ▶ **Hoge knolzetting**



KARAKTERISTIEKEN

Algemene kenmerken

Kweker: Saatzucht Berding
Kruising: NENA x DUNJA
Kwekersrecht: 31-12-2028
Zaailing: NKG 86-1158

Plant- en knoleigenschappen

Rijptijd: laat / 5
Kiemkleur: blauw paars / BV
Bloemkleur: wit / W
Hoeveelheid bessen: zeer veel / 4
Loof - ontwikkeling begin: vrij snel / 7
Loof - ontwikkeling volledig: goed / 8
Loof - stevigheid plant: vrij stevig / 7
Schilkleur: geel / Y
Vleeskleur: geel / 7
Schilhoedanigheid: goed / 7
Knolvorm: ovaal / O
Regelmaat knolvorm: vrij onregelmatig / 5
Knolzetting: hoog / 8
Knalgrootte: vrij grof / 7,5
Regelmaat sortering: vrij regelmatig / 6,5
Kiemrust: gemiddeld / 6

Gevoeligheid en kwaliteit

Doorwas: redelijk gevoelig / 6
Blauwgevoeligheid: weinig gevoelig / 7
Groeischeuren: redelijk gevoelig / 6
Roibeschatiging: gevoelig / 5
Ethyleen: - / -
Talent: - / -
Onderwatergewicht: 380
Drogestofgehalte: 20,7%
Kooktype: vrij kruimig / B
Grauwverkleuring (na koken): redelijk gevoelig / 6,5
Rauwverkleuring: redelijk gevoelig / 6,5
Frietkwaliteit: niet geschikt / 4
Drogestofverdeling: - / -
Chipskwaliteit: niet geschikt / 4
TGA-gehalte: 2,4

TEELTADVIES



www.agricopotatoes.nl

Teeltadvies ¹

Stikstof: standaard advies + 10%.

Fosfaat: standaard advies.

Kalium: standaard advies.

Pootgoedbehandeling

Goed voorkiemen na het verwijderen van de topspruit kan een positief resultaat geven op de knolzetting. Meer dan eens afkiemen kan een negatief effect hebben op de opbrengst en uniformiteit van de sortering.

Plantafstand

28/35 mm: 20 cm (67.000 planten/ha)

35/50 mm: 25 cm (54.000 planten/ha)

¹ Bemestingsadvies is gebaseerd op bodemanalyse

Onkruiden

Een standaard dosering Metribuzin (Sencor) vóór en na opkomst geeft geen loof reactie of opbrengstderving.

Schimmels

Een strikt preventief spuitschema is noodzakelijk.

Oogst

Wacht tenminste twee weken na loofdoding, vanwege de gevoeligheid voor rooibeschatiging en/of stootblauw.

Bewaartemperatuur - Bewaarperiode

Geadviseerde bewaartemperatuur is 5 °C. Geschikt voor middellange bewaring.



Say potato,
say Agrico.

Resistenties

Virus - Bladrol: weinig vatbaar / 7

Virus - Yn: weinig vatbaar / 6

Virus - Yntn (knol): weinig vatbaar / 6

Kringerigheid: vatbaar / 5

Phytophthora loof: zeer vatbaar / 4,5

Phytophthora knol: weinig vatbaar / 6

Fusarium: vatbaar / 5

Schurft: weinig vatbaar / 7

Poederschurft: weinig vatbaar / 6

Zwarte spikkel: - / -

Wratziekte F1 (D1): - / -

Wratziekte F6 (O1): - / -

Wratziekte F18 (T1): - / -

Aardappelmoetheid Ro 1/4 (A): resistent / 9

Aardappelmoetheid Ro 2/3 (B/C): - / -

Aardappelmoetheid Pa 2 (D): - / -

Aardappelmoetheid Pa 3 (E): - / -