

# Napoleon.

Een laat aardappelras voor chips met een goede regelmaat en een hoog onderwatergewicht.



**Verwerkende  
industrie**  
Chips

- ▶ **Goede chipskwaliteit**
- ▶ **Uitstekende bewaarbaarheid**
- ▶ **Goede virusresistenties**



## characteristics

### Algemene kenmerken

Kweker: Agrico Research B.V.  
Kruising: ANTINA x ALICANTE  
Kwekersrecht: 31-12-2051  
Zaailing: AR 10-4637

### Plant- en knoleigenschappen

Rijptijd: laat / 5  
Kiemkleur: rood paars / RV  
Bloemkleur: wit / W  
Hoeveelheid bessen: zeer veel / 4  
Loof - ontwikkeling begin: vrij snel / 7  
Loof - ontwikkeling volledig: goed / 8  
Loof - stevigheid plant: vrij stevig / 7,5  
Schilkleur: geel / Y  
Vleeskleur: lichtgeel / 6,5  
Schilhoedanigheid: matig / 5  
Knolvorm: rond ovaal / RO  
Regelmaat knolvorm: regelmatig / 7  
Knolzetting: gemiddeld / 6  
Knalgrootte: vrij grof / 7,5  
Regelmaat sortering: regelmatig / 7  
Kiemrust: gemiddeld / 6

### Gevoeligheid en kwaliteit

Doorwas: redelijk gevoelig / 6,5  
Blauwgevoeligheid: gevoelig / 5,5  
Groeischeuren: redelijk gevoelig / 6  
Roibeschatiging: zeer gevoelig / 4,5  
Ethyleen: 5% minder tot 5% meer knollen / 5  
Talent: 25% meer knollen / 8  
Onderwatergewicht: 450  
Drogestofgehalte: 24,1%  
Kooktype: kruimig / BC  
Grauwverkleuring (na koken): redelijk gevoelig / 6  
Rauwverkleuring: redelijk gevoelig / 6  
Frietkwaliteit: goed / 7  
Drogestofverdeling: goed / 7  
Chipskwaliteit: uitstekend / 8  
TGA-gehalte: 4,0

# How to grow



[www.agricopotatoes.nl](http://www.agricopotatoes.nl)

## Teeltadvies <sup>1</sup>

Stikstof: standaard advies - 10%.

Fosfaat: standaard advies.

Kalium: standaard advies + 20%.

## Pootgoedbehandeling

Goed voorkiemen na het verwijderen van de topspruit kan een positief resultaat geven op de knolzetting. Afkiemen kan een negatief effect hebben op de opbrengst en uniformiteit van de sortering.

## Planting distance

28/35 mm: 25 cm (54.000 planten/ha)

35/55 mm: 30 cm (45.000 planten/ha)

50/55 mm: 40 cm (33.000 planten/ha)

<sup>1</sup> Bemestingsadvies is gebaseerd op bodemanalyse

## Onkruiden

Een standaard dosering Metribuzin (Sencor) vóór en na opkomst geeft geen loof reactie of opbrengstderving.

## Schimmels

Een strikt preventief spuitschema wordt geadviseerd.

## Oogst

Wacht tenminste drie weken na loofdding, vanwege de gevoeligheid voor rooibeschatiging en/of stootblauw.

## Bewaartemperatuur - Bewaarperiode

Voor verwerkingsdoeleinden niet kouder bewaren dan 9 °C. Geschikt voor middellange tot lange bewaring.



Say potato,  
say Agrico.

## Resistenties

Virus - Bladrol: - / -

Virus - Yn: weinig tot niet vatbaar / 8

Virus - Yntn (knol): weinig tot niet vatbaar / 8

Kringerigheid: vatbaar / 5

Phytophthora loof: weinig vatbaar / 6

Phytophthora knol: weinig vatbaar / 6,5

Fusarium: weinig vatbaar / 6,5

Schurft: weinig vatbaar / 6

Poederschurft: - / -

Zwarte spikkel: weinig vatbaar / 6

Wratziekte F1 (D1): resistent / 10

Wratziekte F6 (O1): - / -

Wratziekte F18 (T1): - / -

Aardappelmoetheid Ro 1/4 (A): resistent / 9

Aardappelmoetheid Ro 2/3 (B/C): - / -

Aardappelmoetheid Pa 2 (D): vatbaar / 4

Aardappelmoetheid Pa 3 (E): vatbaar / 2