

Nirvana.

Een middenlaat aardappelras voor verwerking in de fritesindustrie, geschikt voor gangbare en biologische teelt.



Biologisch



Verwerkende
industrie
Frites

- ▶ Hoog onderwatergewicht
- ▶ Goede drogestofverdeling
- ▶ Phytophthora resistentie



characteristics

Algemene kenmerken

Kweker: Agrico Research B.V.
Kruising: CAROLUS x PERFORMER
Kwekersrecht: 31-12-2051
Zaailing: AR 10-2460

Plant- en knoleigenschappen

Rijptijd: middenlaat / 5,5
Kiemkleur: rood / R
Bloemkleur: paars / P
Hoeveelheid bessen: benedengemiddeld / 6,5
Loof - ontwikkeling begin: vrij snel / 7,5
Loof - ontwikkeling volledig: goed / 8
Loof - stevigheid plant: stevig / 8
Schilkleur: geel / Y
Vleeskleur: geel / 7
Schilhoedanigheid: matig / 5
Knolvorm: ovaal / O
Regelmaat knolvorm: regelmatig / 7
Knolzetting: gemiddeld / 6
Knolgrootte: vrij grof / 7,5
Regelmaat sortering: vrij regelmatig / 6,5
Kiemrust: lang / 8

Gevoeligheid en kwaliteit

Doorwas: redelijk gevoelig / 6
Blauwgevoeligheid: redelijk gevoelig / 6,5
Groeischeuren: weinig gevoelig / 7
Roibeschatiging: gevoelig / 5
Ethyleen: 25% meer knollen / 8
Talent: 15% tot 25% meer knollen / 7
Onderwatergewicht: 422
Drogestofgehalte: 22,8%
Kooktype: kruimig / BC
Grauwverkleuring (na koken): redelijk gevoelig / 6,5
Rauwverkleuring: gevoelig / 5
Frietkwaliteit: goed / 7
Drogestofverdeling: uitstekend / 8
Chipskwaliteit: gemiddeld / 6
TGA-gehalte: 4,85

How to grow



www.agricopotatoes.nl

Teeltadvies ¹

Stikstof: standaard advies.
Fosfaat: standaard advies.
Kalium: standaard advies + 25%.

Pootgoedbehandeling

Goed voorkiemen na het verwijderen van de topspruit kan een positief resultaat geven op de knolzetting.

Planting distance

28/35 mm: 25 cm (54.000 planten/ha)
35/55 mm: 30 cm (45.000 planten/ha)
50/55 mm: 40 cm (33.000 planten/ha)

Onkruiden

Gebruik geen Metribuzin (Sencor). Dit geeft een ernstige loofreactie en opbrengstderving.

Schimmels

Ondanks de phytophthora resistentie, blijf alert voor infecties.

Oogst

Wacht tenminste drie weken na loofddoding, vanwege de gevoeligheid voor rooibeschatiging en/of stootblauw.

Bewaartemperatuur - Bewaarperiode

Voor verwerkingsdoeleinden niet kouder bewaren dan 7 °C. Geschikt voor middellange tot lange bewaring.

¹ Bemestingsadvies is gebaseerd op bodemanalyse



Say potato,
say Agrico.

Resistenties

Virus - Bladrol: - / -
Virus - Yn: vatbaar / 5,5
Virus - Yntn (knol): vatbaar / 5,5
Kringrigheid: vatbaar / 5,5
Phytophthora loof: weinig tot niet vatbaar / 9
Phytophthora knol: weinig tot niet vatbaar / 9
Fusarium: weinig tot niet vatbaar / 8
Schurft: vatbaar / 5

Poederschurft: weinig tot niet vatbaar / 8
Zwarte spikkel: vatbaar / 5,5
Wratziekte F1 (D1): zwaar vatbaar / 1
Wratziekte F6 (O1): - / -
Wratziekte F18 (T1): - / -
Aardappelmoehheid Ro 1/4 (A): - / -
Aardappelmoehheid Ro 2/3 (B/C): - / -
Aardappelmoehheid Pa 2 (D): weinig vatbaar / 5
Aardappelmoehheid Pa 3 (E): vatbaar / 2