TEELTAANBEVELING

Nirvana.

Een middenlaat aardappelras voor verwerking in de fritesindustrie, geschikt voor gangbare en biologische teelt.

Biologisch

Verwerkende industrie
Frites

- **Hoog onderwatergewicht**
- **Goede drogestofverdeling**
- **Phytophthora resistentie**



Karakteristieken

Algemene kenmerken

Kweker: Agrico Research B.V.
Kruising: CAROLUS x PERFORMER
Kwekersrecht: 31-12-2051
Zaailing: AR 10-2460

Plant- en knoleigenschappen

Rijptijd: middenlaat / 5,5
Kiemkleur: rood / R
Bloemkleur: paars / P
Hoeveelheid bessen: benedengemiddeld / 6,5
Loof - ontwikkeling begin: vrij snel / 7,5
Loof - ontwikkeling volledig: goed / 8
Loof - stevigheid plant: stevig / 8
Schilkleur: geel / Y
Vleeskleur: geel / 7
Schilhoedanigheid: matig / 5
Knolvorm: ovaal / O
Regelmaat knolvorm: regelmatig / 7
Knolzetting: gemiddeld / 6
Knolgrootte: vrij grof / 7,5
Regelmaat sortering: vrij regelmatig / 6,5
Kiemrust: lang / 8

Gevoeligheid en kwaliteit

Doorwas: redelijk gevoelig / 6
Blauwgevoeligheid: redelijk gevoelig / 6,5
Groeischeuren: weinig gevoelig / 7
Rooibeschadiging: gevoelig / 5
Ethyleen: 25% meer knollen / 8
Talent: 15% tot 25% meer knollen / 7
Onderwatergewicht: 422
Drogestofgehalte: 22,8%
Kooktype: kruimig / BC
Grauwverkleuring (na koken): redelijk gevoelig / 6,5
Rauwverkleuring: gevoelig / 5
Frietkwaliteit: uitstekend / 8
Drogestofverdeling: uitstekend / 8
Chipskwaliteit: gemiddeld / 6
TGA-gehalte (mg/100 gr): 4,85 mg/100g

Agrico stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele schadelijke gevolgen die kunnen ontstaan bij het gebruik maken van de gegevens.

AGRICO

TEELTAANBEVELING

Teeltadvies

www.agricopotatoes.nl

Teeltadvies [1]

Stikstof: standaard advies.
Fosfaat: standaard advies.
Kalium: standaard advies + 25%.

Pootgoedbehandeling

Goed voorkiemen na het verwijderen van de topspruit kan een positief resultaat geven op de knolzetting.

Plantafstand

28/35 mm: 25 cm (54.000 planten/ha)
35/55 mm: 30 cm (45.000 planten/ha)
50/55 mm: 40 cm (33.000 planten/ha)

Schimmels

Ondanks de phytophthora resistentie, blijf alert voor infecties.

Oogst

Wacht tenminste drie weken na loofdoding, vanwege de gevoeligheid voor rooibeschadiging en/of stootblauw.

Bewaartemperatuur - Bewaarperiode

Voor verwerkingsdoeleinden niet kouder bewaren dan 7 °C. Geschikt voor middellange tot lange bewaring.

[1] Bemestingsadvies is gebaseerd op bodemanalyse



Say potato, say Agrico.

Resistenties

Virus - Bladrol: - / -
Virus - Yn: vatbaar / 5,5
Virus - Yntn (knol): vatbaar / 5,5
Kringerigheid: vatbaar / 5,5
Phytophthora loof: weinig tot niet vatbaar / 9
Phytophthora knol: weinig tot niet vatbaar / 9
Fusarium: weinig tot niet vatbaar / 8
Schurft: vatbaar / 5
Poederschurft: weinig tot niet vatbaar / 8
Zwarte spikkel: vatbaar / 5,5
Wratziekte F1 (D1): zwaar vatbaar / 1
Wratziekte F6 (O1): - / -
Wratziekte F18 (T1): - / -
Aardappelmoeheid Ro 1/4 (A): - / -
Aardappelmoeheid Ro 2/3 (B/C): - / -
Aardappelmoeheid Pa 2 (D): weinig vatbaar / 5
Aardappelmoeheid Pa 3 (E): vatbaar / 2

Agrico • Duit 15 • 8305 BB Emmeloord +31 (0)527 639911 info@agrico.nl agricopotatoes.nl