TEELTAANBEVELING

Palace.

Een laatrijpend, hoogopbrengend aardappelras voor verwerking in de fritesindustrie en geschikt voor teelt op diverse grondsoorten.

Verwerkende industrie
Frites
Vlokken

Retail
Vers

Traditioneel

- **Lage stikstofbehoefte**
- **Hoge opbrengst**
- **Uniforme sortering**
- **Hoog knolaantal**
- **Uitstekende friteskwaliteit**



Karakteristieken

Algemene kenmerken

Kweker: Agrico Research B.V.
Kruising: AR 01-3350 x ADD 93-20902
Kwekersrecht: 31-12-2049
Zaailing: AR 08-4241

Plant- en knoleigenschappen

Rijptijd: laat / 4,5
Kiemkleur: groen rood / GR
Bloemkleur: paars / P
Hoeveelheid bessen: zeer veel / 4
Loof - ontwikkeling begin: vrij snel / 7,5
Loof - ontwikkeling volledig: goed / 8
Loof - stevigheid plant: vrij stevig / 7,5
Schilkleur: geel / Y
Vleeskleur: lichtgeel / 6
Schilhoedanigheid: gemiddeld / 6
Knolvorm: ovaal / O
Regelmaat knolvorm: regelmatig / 7
Knolzetting: gemiddeld / 6
Knolgrootte: vrij grof / 7,5
Regelmaat sortering: vrij regelmatig / 6,5
Kiemrust: vrij kort / 5

Gevoeligheid en kwaliteit

Doorwas: redelijk gevoelig / 6
Blauwgevoeligheid: redelijk gevoelig / 6
Groeischeuren: redelijk gevoelig / 6,5
Rooibeschadiging: gevoelig / 5
Ethyleen: 5% tot 15% meer knollen / 6
Talent: 25% meer knollen / 8
Onderwatergewicht: 430
Drogestofgehalte: 23,2%
Kooktype: kruimig / C
Grauwverkleuring (na koken): weinig gevoelig / 7
Rauwverkleuring: redelijk gevoelig / 6
Frietkwaliteit: uitstekend / 8
Drogestofverdeling: gemiddeld / 6
Chipskwaliteit: gemiddeld / 6
TGA-gehalte (mg/100 gr): 13,1 mg/100g

Agrico stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele schadelijke gevolgen die kunnen ontstaan bij het gebruik maken van de gegevens.

AGRICO

TEELTAANBEVELING

Teeltadvies

www.agricopotatoes.nl

Teeltadvies [1]

Stikstof: standaard advies - 25%.
Fosfaat: standaard advies.
Kalium: standaard advies + 25%.

Pootgoedbehandeling

Meer dan eens afkiemen kan een negatief effect hebben op de opbrengst en uniformiteit van de sortering.Een korte warmtestoot of goed voorkiemen wordt aanbevolen.

Plantafstand

28/35 mm: 25 cm (54.000 planten/ha)
35/50 mm: 33 cm (40.000 planten/ha)
50/55 mm: 39 cm (33.000 planten/ha)

Schimmels

Een strikt preventief spuitschema is noodzakelijk.

Oogst

Wacht tenminste drie weken na loofdoding, vanwege de gevoeligheid voor rooibeschadiging en/of stootblauw.

Bewaartemperatuur - Bewaarperiode

Geadviseerde bewaartemperatuur is 5 °C. Voor verwerkingsdoeleinden niet kouder bewaren dan 7 °C. Geschikt voor middellange tot lange bewaring.

[1] Bemestingsadvies is gebaseerd op bodemanalyse



Say potato, say Agrico.

Resistenties

Virus - Bladrol: - / -
Virus - Yn: weinig vatbaar / 7,5
Virus - Yntn (knol): weinig vatbaar / 6
Kringerigheid: vatbaar / 5,5
Phytophthora loof: vatbaar / 5
Phytophthora knol: weinig vatbaar / 6,5
Fusarium: vatbaar / 5,5
Schurft: weinig vatbaar / 6
Poederschurft: weinig vatbaar / 7,5
Zwarte spikkel: vatbaar / 5
Wratziekte F1 (D1): - / -
Wratziekte F6 (O1): - / -
Wratziekte F18 (T1): - / -
Aardappelmoeheid Ro 1/4 (A): - / -
Aardappelmoeheid Ro 2/3 (B/C): - / -
Aardappelmoeheid Pa 2 (D): vatbaar / 2
Aardappelmoeheid Pa 3 (E): vatbaar / 2

Agrico • Duit 15 • 8305 BB Emmeloord +31 (0)527 639911 info@agrico.nl agricopotatoes.nl