

Palace.

Een laatrijpend, hoogopbrengend aardappelas voor verwerking in de fritesindustrie en geschikt voor teelt op diverse grondsoorten.



**Verwerkende
industrie**
Frites
Vlokken



**Retail
Vers**



Traditioneel

- ▶ **Lage stikstofbehoefte**
- ▶ **Hoge opbrengst**
- ▶ **Uniforme sortering**
- ▶ **Hoog knolaantal**
- ▶ **Uitstekende friteskwaliteit**



characteristics

Algemene kenmerken

Kweker: Agrico Research B.V.
Kruising: AR 01-3350 x ADD 93-20902
Kwekersrecht: 31-12-2049
Zaailing: AR 08-4241

Plant- en knoleigenschappen

Rijptijd: laat / 4,5
Kiemkleur: groen rood / GR
Bloemkleur: paars / P
Hoeveelheid bessen: zeer veel / 4
Loof - ontwikkeling begin: vrij snel / 7,5
Loof - ontwikkeling volledig: goed / 8
Loof - stevigheid plant: vrij stevig / 7,5
Schilkleur: geel / Y
Vleeskleur: lichtgeel / 6
Schilhoedanigheid: gemiddeld / 6
Knolvorm: ovaal / O
Regelmaat knolvorm: regelmatig / 7
Knolzetting: gemiddeld / 6
Knalgrootte: vrij grof / 7,5
Regelmaat sortering: vrij regelmatig / 6,5
Kiemrust: vrij kort / 5

Gevoeligheid en kwaliteit

Doorwas: redelijk gevoelig / 6
Blauwgevoeligheid: redelijk gevoelig / 6
Groeischeuren: redelijk gevoelig / 6,5
Roibeschatting: gevoelig / 5
Ethyleen: 5% tot 15% meer knollen / 6
Talent: 25% meer knollen / 8
Onderwatergewicht: 430
Drogestofgehalte: 23,2%
Kooktype: kruimig / C
Grauwverkleuring (na koken): weinig gevoelig / 7
Rauwverkleuring: redelijk gevoelig / 6
Frietkwaliteit: uitstekend / 8
Drogestofverdeling: gemiddeld / 6
Chipskwaliteit: gemiddeld / 6
TGA-gehalte: 13,1

How to grow



www.agricopotatoes.com

Teeltadvies ¹

Stikstof: standaard advies - 25%.

Fosfaat: standaard advies.

Kalium: standaard advies + 25%.

Pootgoedbehandeling

Meer dan eens afkiemen kan een negatief effect hebben op de opbrengst en uniformiteit van de sortering. Een korte warmtestoot of goed voorkiemen wordt aanbevolen.

Planting distance

28/35 mm: 25 cm (54.000 planten/ha)

35/50 mm: 33 cm (40.000 planten/ha)

50/55 mm: 39 cm (33.000 planten/ha)

Onkruiden

Een standaard dosering Metribuzin (Sencor) vóór en na opkomst kan enige reactie in het loof veroorzaken maar geeft zelden opbrengstderving.

Schimmels

Een strikt preventief spuitschema is noodzakelijk.

Oogst

Wacht tenminste drie weken na loofdding, vanwege de gevoeligheid voor rooibeschatiging en/of stootblauw.

Bewaartemperatuur - Bewaarperiode

Geadviseerde bewaartemperatuur is 5 °C. Voor verwerkingsdoeleinden niet kouder bewaren dan 7 °C. Geschikt voor middellange tot lange bewaring.

¹ Bemestingsadvies is gebaseerd op bodemanalyse



Say potato,
say Agrico.

Resistenties

Virus - Bladrol: - / -

Virus - Yn: weinig vatbaar / 7,5

Virus - Yntn (knol): weinig vatbaar / 6

Kringerigheid: vatbaar / 5,5

Phytophthora loof: vatbaar / 5

Phytophthora knol: weinig vatbaar / 6,5

Fusarium: vatbaar / 5,5

Schurft: weinig vatbaar / 6

Poederschurft: weinig vatbaar / 7,5

Zwarte spikkel: vatbaar / 5

Wratziekte F1 (D1): - / -

Wratziekte F6 (O1): - / -

Wratziekte F18 (T1): - / -

Aardappelmoetheid Ro 1/4 (A): - / -

Aardappelmoetheid Ro 2/3 (B/C): - / -

Aardappelmoetheid Pa 2 (D): vatbaar / 2

Aardappelmoetheid Pa 3 (E): vatbaar / 2