


Paradiso.



Traditioneel

Een middenlaat, grofgroeiend aardappelas met een hoge opbrengst voor de traditionele markten.

- ▶ **Prachtige uitstraling**
- ▶ **Hoge opbrengst**
- ▶ **Sterk loof**
- ▶ **Krachtige groei**



characteristics

Algemene kenmerken

Kweker: M. Pot & M. Klaver
 Kruising: RODEO x VALOR
 Kwekersrecht: 31-12-2048
 Zaailing: PK 06-0108

Plant- en knoleigenschappen

Rijptijd: middenlaat / 6
 Kiemkleur: rood / R
 Bloemkleur: paars / P
 Hoeveelheid bessen: benedengemiddeld / 6,5
 Loof - ontwikkeling begin: vrij snel / 7,5
 Loof - ontwikkeling volledig: vrij goed / 7,5
 Loof - stevigheid plant: vrij stevig / 7
 Schilkleur: geel / Y
 Vleeskleur: lichtgeel / 6
 Schilhoedanigheid: goed / 7
 Knolvorm: ovaal lang / OL
 Regelmaat knolvorm: vrij regelmatig / 6,5
 Knolzetting: gemiddeld / 6
 Knalgrootte: grof / 8
 Regelmaat sortering: vrij regelmatig / 6,5
 Kiemrust: gemiddeld / 6

Gevoeligheid en kwaliteit

Doorwas: weinig gevoelig / 7
 Blauwgevoeligheid: weinig gevoelig / 7,5
 Groeischeuren: redelijk gevoelig / 6,5
 Rooibeschaaging: redelijk gevoelig / 6,5
 Ethyleen: 5% tot 15% meer knollen / 6
 Talent: 5% minder knollen / 4
 Onderwatergewicht: 329
 Drogestofgehalte: 18,2%
 Kooktype: vrij kruimig / B
 Grauwverkleuring (na koken): redelijk gevoelig / 6,5
 Rauwverkleuring: - / -
 Frietkwaliteit: niet geschikt / 4,5
 Drogestofverdeling: - / -
 Chipskwaliteit: niet geschikt / 4
 TGA-gehalte: 4,8

How to grow



www.agricopotatoes.com

Teeltadvies ¹

Stikstof: standaard advies - 20%. Bij voorkeur een gedeelde gift en de tweede gift kort na knolzetting.

Fosfaat: standaard advies.

Kalium: standaard advies.

Pootgoedbehandeling

Afkiemen kan een negatief effect hebben op de opbrengst en uniformiteit van de sortering.

Planting distance

28/35 mm: 23 cm (58.000 planten/ha)

35/55 mm: 33 cm (40.000 planten/ha)

Onkruiden

Een standaard dosering Metribuzin (Sencor) vóór en na opkomst geeft geen loof reactie of opbrengstderving.

Schimmels

Een strikt preventief spuitschema wordt geadviseerd.

Oogst

Wacht tenminste twee weken na loofdoding, vanwege de gevoeligheid voor rooibeschatiging en/of stootblauw.

Bewaartemperatuur - Bewaarperiode

Geadviseerde bewaartemperatuur is 4 °C. Geschikt voor middellange bewaring.

¹ Bemestingsadvies is gebaseerd op bodemanalyse



Say potato,
say Agrico.

Resistenties

Virus - Bladrol: - / -

Virus - Yn: weinig vatbaar / 6

Virus - Yntn (knol): weinig vatbaar / 7,5

Kringerigheid: zeer vatbaar / 4

Phytophthora loof: vatbaar / 5,5

Phytophthora knol: weinig vatbaar / 6,5

Fusarium: vatbaar / 5

Schurft: vatbaar / 5,5

Poederschurft: weinig vatbaar / 7,5

Zwarte spikkel: vatbaar / 5,5

Wratziekte F1 (D1): resistent / 10

Wratziekte F6 (O1): - / -

Wratziekte F18 (T1): - / -

Aardappelmoetheid Ro 1/4 (A): resistent / 9

Aardappelmoetheid Ro 2/3 (B/C): - / -

Aardappelmoetheid Pa 2 (D): - / -

Aardappelmoetheid Pa 3 (E): - / -