


# Paradiso.



Traditioneel

Een middenlaat, grofgroeiend aardappelas met een hoge opbrengst voor de traditionele markten.

- ▶ **Prachtige uitstraling**
- ▶ **Hoge opbrengst**
- ▶ **Sterk loof**
- ▶ **Krachtige groei**



## characteristics

### Algemene kenmerken

Kweker: M. Pot & M. Klaver  
 Kruising: RODEO x VALOR  
 Kwekersrecht: 31-12-2048  
 Zaailing: PK 06-0108

### Plant- en knoleigenschappen

Rijptijd: middenlaat / 6  
 Kiemkleur: rood / R  
 Bloemkleur: paars / P  
 Hoeveelheid bessen: benedengemiddeld / 6,5  
 Loof - ontwikkeling begin: vrij snel / 7,5  
 Loof - ontwikkeling volledig: vrij goed / 7,5  
 Loof - stevigheid plant: vrij stevig / 7  
 Schilkleur: geel / Y  
 Vleeskleur: lichtgeel / 6  
 Schilhoedanigheid: goed / 7  
 Knolvorm: ovaal lang / OL  
 Regelmaat knolvorm: vrij regelmatig / 6,5  
 Knolzetting: gemiddeld / 6  
 Knolgrootte: grof / 8  
 Regelmaat sortering: vrij regelmatig / 6,5  
 Kiemrust: gemiddeld / 6

### Gevoeligheid en kwaliteit

Doorwas: weinig gevoelig / 7  
 Blauwgevoeligheid: weinig gevoelig / 7,5  
 Groeischeuren: redelijk gevoelig / 6,5  
 Rooibeschatting: redelijk gevoelig / 6,5  
 Ethyleen: 5% tot 15% meer knollen / 6  
 Talent: 5% minder knollen / 4  
 Onderwatergewicht: 329  
 Drogestofgehalte: 18,2%  
 Kooktype: vrij kruimig / B  
 Grauwverkleuring (na koken): redelijk gevoelig / 6,5  
 Rauwverkleuring: - / -  
 Frietkwaliteit: niet geschikt / 4,5  
 Drogestofverdeling: - / -  
 Chipskwaliteit: niet geschikt / 4  
 TGA-gehalte: 4,8

# How to grow



[www.agricopotatoes.nl](http://www.agricopotatoes.nl)

## Teeltadvies <sup>1</sup>

**Stikstof:** standaard advies - 20%. Bij voorkeur een gedeelde gift en de tweede gift kort na knolzetting.

**Fosfaat:** standaard advies.

**Kalium:** standaard advies.

## Pootgoedbehandeling

Afkiemen kan een negatief effect hebben op de opbrengst en uniformiteit van de sortering.

## Planting distance

28/35 mm: 23 cm (58.000 planten/ha)

35/55 mm: 33 cm (40.000 planten/ha)

## Onkruiden

Een standaard dosering Metribuzin (Sencor) vóór en na opkomst geeft geen loof reactie of opbrengstderving.

## Schimmels

Een strikt preventief spuitschema wordt geadviseerd.

## Oogst

Wacht tenminste twee weken na loofdoding, vanwege de gevoeligheid voor rooibeschatiging en/of stootblauw.

## Bewaartemperatuur - Bewaarperiode

Geadviseerde bewaartemperatuur is 4 °C. Geschikt voor middellange bewaring.

<sup>1</sup> Bemestingsadvies is gebaseerd op bodemanalyse



Say potato,  
say Agrico.

## Resistenties

**Virus - Bladrol:** - / -

**Virus - Yn:** weinig vatbaar / 6

**Virus - Yntn (knol):** weinig vatbaar / 7,5

**Kringrigheid:** zeer vatbaar / 4

**Phytophthora loof:** vatbaar / 5,5

**Phytophthora knol:** weinig vatbaar / 6,5

**Fusarium:** vatbaar / 5

**Schurft:** vatbaar / 5,5

**Poederschurft:** weinig vatbaar / 7,5

**Zwarte spikkel:** vatbaar / 5,5

**Wratziekte F1 (D1):** resistent / 10

**Wratziekte F6 (O1):** - / -

**Wratziekte F18 (T1):** - / -

**Aardappelmoetheid Ro 1/4 (A):** resistent / 9

**Aardappelmoetheid Ro 2/3 (B/C):** - / -

**Aardappelmoetheid Pa 2 (D):** - / -

**Aardappelmoetheid Pa 3 (E):** - / -