TEELTAANBEVELING

Ranomi.

Een vroeg aardappelras voor consumptie met een goede schurftresistentie en vroeg een goede opbrengst.

- **Goede schilhoedanigheid**
- **Grove knollen**
- **Vrij vastkokend**

Retail
Vers

Traditioneel



Karakteristieken

Algemene kenmerken

Kweker: Agrico Research B.V.
Kruising: AR 93-033-79 x AR 95-0319
Kwekersrecht: 31-12-2044
Zaailing: AR 03-0221

Plant- en knoleigenschappen

Rijptijd: vroeg / 7,5
Kiemkleur: rood paars / RV
Bloemkleur: wit / W
Hoeveelheid bessen: gemiddeld / 6
Loof - ontwikkeling begin: vrij snel / 7,5
Loof - ontwikkeling volledig: gemiddeld / 7
Loof - stevigheid plant: gemiddeld / 6,5
Schilkleur: geel / Y
Vleeskleur: lichtgeel / 6,5
Schilhoedanigheid: goed / 7
Knolvorm: ovaal lang / OL
Regelmaat knolvorm: regelmatig / 7
Knolzetting: gemiddeld / 6
Knolgrootte: vrij grof / 7
Regelmaat sortering: regelmatig / 7
Kiemrust: gemiddeld / 6

Gevoeligheid en kwaliteit

Doorwas: redelijk gevoelig / 6
Blauwgevoeligheid: weinig tot niet gevoelig / 8
Groeischeuren: redelijk gevoelig / 6,5
Rooibeschadiging: redelijk gevoelig / 6
Ethyleen: 5% tot 15% meer knollen / 6
Talent: 15% tot 25% meer knollen / 7
Onderwatergewicht: 322
Drogestofgehalte: 17,9%
Kooktype: vrij vastkokend / AB
Grauwverkleuring (na koken): redelijk gevoelig / 6
Rauwverkleuring: - / -
Frietkwaliteit: bovengemiddeld / 6,5
Drogestofverdeling: - / -
Chipskwaliteit: niet geschikt / 5
TGA-gehalte (mg/100 gr): 4,08 mg/100g

Agrico stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele schadelijke gevolgen die kunnen ontstaan bij het gebruik maken van de gegevens.

AGRICO

TEELTAANBEVELING

Teeltadvies

www.agricopotatoes.nl

Teeltadvies [1]

Stikstof: standaard advies.Bij voorkeur een gedeelde gift en de tweede gift kort na knolzetting.

Fosfaat: standaard advies.

Kalium: standaard advies + 10%.

Pootgoedbehandeling

Kan direct uit de koelcel geplant worden, bij voorkeur na een korte warmtestoot.Meer dan eens afkiemen kan een negatief effect hebben op de opbrengst en uniformiteit van de sortering.

Plantafstand

28/35 mm: 25 cm (54.000 planten/ha)
35/55 mm: 30 cm (45.000 planten/ha)

Schimmels

Een strikt preventief spuitschema is noodzakelijk.

Oogst

Wacht tenminste twee weken na loofdoding, vanwege de gevoeligheid voor rooibeschadiging en/of stootblauw.

Bewaartemperatuur - Bewaarperiode

Geadviseerde bewaartemperatuur is 4 °C. Geschikt voor levering direct vanuit het veld en voor korte bewaring.

[1] Bemestingsadvies is gebaseerd op bodemanalyse



Say potato, say Agrico.

Resistenties

Virus - Bladrol: - / -
Virus - Yn: vatbaar / 5,5
Virus - Yntn (knol): weinig vatbaar / 6
Kringerigheid: weinig vatbaar / 6,5
Phytophthora loof: zeer vatbaar / 4
Phytophthora knol: weinig vatbaar / 6
Fusarium: vatbaar / 5
Schurft: weinig vatbaar / 6,5

Poederschurft: zeer vatbaar / 4,5
Zwarte spikkel: weinig vatbaar / 7
Wratziekte F1 (D1): resistent / 10
Wratziekte F6 (O1): - / -
Wratziekte F18 (T1): - / -
Aardappelmoeheid Ro 1/4 (A): resistent / 9
Aardappelmoeheid Ro 2/3 (B/C): - / -
Aardappelmoeheid Pa 2 (D): - / -
Aardappelmoeheid Pa 3 (E): - / -

Agrico • Duit 15 • 8305 BB Emmeloord +31 (0)527 639911 info@agrico.nl agricopotatoes.nl