

Spectra.

Een middenvroeg, hoogopbrengend aardappelas voor consumptie met een zeer regelmatige knolvorm en een mooie schilhoedanigheid.




Retail
Vers



Traditioneel

- ▶ **Grove knollen**
- ▶ **Hoge knolzetting**
- ▶ **Regelmatische sortering**



characteristics

Algemene kenmerken

Kweker: Lantmännen Seed B.V.
Kruising: ARIELLE x SOFIA
Kwekersrecht: 31-12-2046
Zaailing: SW 05-1431

Plant- en knoleigenschappen

Rijptijd: middenvroeg / 7
Kiemkleur: rood paars / RV
Bloemkleur: wit / W
Hoeveelheid bessen: zeer veel / 4
Loof - ontwikkeling begin: snel / 8
Loof - ontwikkeling volledig: vrij goed / 7,5
Loof - stevigheid plant: gemiddeld / 6,5
Schilkleur: geel / Y
Vleeskleur: lichtgeel / 6
Schilhoedanigheid: zeer goed / 7,5
Knolvorm: ovaal rond / OR
Regelmaat knolvorm: regelmatig / 7,5
Knolzetting: vrij hoog / 7
Knolgrootte: vrij grof / 7,5
Regelmaat sortering: vrij regelmatig / 6,5
Kiemrust: vrij kort / 5

Gevoeligheid en kwaliteit

Doorwas: redelijk gevoelig / 6,5
Blauwgevoeligheid: weinig gevoelig / 7,5
Groeischeuren: redelijk gevoelig / 6
Roibeschatiging: redelijk gevoelig / 6
Ethyleen: 5% minder tot 5% meer knollen / 5
Talent: 5% tot 15% meer knollen / 6
Onderwatergewicht: 324
Drogestofgehalte: 17,9%
Kooktype: vrij vastkokend / AB
Grauwverkleuring (na koken): redelijk gevoelig / 6
Rauwverkleuring: zeer gevoelig / 4
Frietkwaliteit: niet geschikt / 4,5
Drogestofverdeling: - / -
Chipskwaliteit: niet geschikt / 4
TGA-gehalte: 4,7

How to grow



www.agricopotatoes.nl

Teeltadvies ¹

Stikstof: standaard advies.

Fosfaat: standaard advies.

Kalium: standaard advies.

Pootgoedbehandeling

Kan direct uit de koelcel geplant worden, bij voorkeur na een korte warmtestoot. Afkiemen kan een negatief effect hebben op de opbrengst en uniformiteit van de sortering.

Planting distance

28/35 mm: 27 cm (50.000 planten/ha)

35/55 mm: 33 cm (40.000 planten/ha)

Het advies is om Spectra wat dieper te poten met een goede rugbedekking om groenverkleuring te voorkomen.

Onkruiden

Een standaard dosering Metribuzin (Sencor) voor en na opkomst kan enige reactie in het loof veroorzaken en kan enige opbrengstderving geven.

Schimmels

Een strikt preventief spuitschema is noodzakelijk.

Oogst

Wacht tenminste twee weken na loofdoding, vanwege de gevoeligheid voor rooibeschatiging en/of stootblauw.

Bewaartemperatuur - Bewaarperiode

Geadviseerde bewaartemperatuur is 4 °C. Geschikt voor middellange bewaring.

¹ Bemestingsadvies is gebaseerd op bodemanalyse



Say potato,
say Agrico.

Resistenties

Virus - Bladrol: - / -

Virus - Yn: weinig vatbaar / 6

Virus - Yntn (knol): weinig vatbaar / 7

Kringerigheid: vatbaar / 5

Phytophthora loof: zeer vatbaar / 4,5

Phytophthora knol: weinig vatbaar / 6

Fusarium: vatbaar / 5,5

Schurft: vatbaar / 5

Poederschurft: zeer vatbaar / 4

Zwarte spikkel: vatbaar / 5

Wratziekte F1 (D1): resistent / 10

Wratziekte F6 (O1): - / -

Wratziekte F18 (T1): - / -

Aardappelmoetheid Ro 1/4 (A): resistent / 9

Aardappelmoetheid Ro 2/3 (B/C): - / -

Aardappelmoetheid Pa 2 (D): - / -

Aardappelmoetheid Pa 3 (E): - / -