

Spunta.



Traditioneel

Een middenlaat aardappelras voor consumptie met goede hittetolerantie en een hoge opbrengst.

- ▶ Grove knollen
- ▶ Goede droogtetolerantie
- ▶ Hoog onderwatergewicht



characteristics

Algemene kenmerken

Kweker: J. Oldenburger
 Kruising: BEA x USDA 96-56
 Kwekersrecht: Verlopen
 Zaailing: Oldenburger 57-88

Plant- en knoleigenschappen

Rijptijd: middenlaat / 6
 Kiemkleur: blauw paars / BV
 Bloemkleur: wit / W
 Hoeveelheid bessen: benedengemiddeld / 6,5
 Loof - ontwikkeling begin: snel / 8
 Loof - ontwikkeling volledig: goed / 8
 Loof - stevigheid plant: vrij stevig / 7,5
 Schilkleur: geel / Y
 Vleeskleur: lichtgeel / 6
 Schilhoedanigheid: gemiddeld / 6
 Knolvorm: lang / L
 Regelmaat knolvorm: vrij regelmatig / 6
 Knolzetting: gemiddeld / 6
 Knolgrootte: grof / 8
 Regelmaat sortering: regelmatig / 7
 Kiemrust: gemiddeld / 6

Gevoeligheid en kwaliteit

Doorwas: redelijk gevoelig / 6
 Blauwgevoeligheid: weinig gevoelig / 7
 Groeischeuren: weinig gevoelig / 7
 Rooibeschatting: zeer gevoelig / 4
 Ethyleen: - / -
 Talent: 5% minder tot 5% meer knollen / 5
 Onderwatergewicht: 387
 Drogestofgehalte: 21%
 Kooktype: kruimig / BC
 Grauwverkleuring (na koken): redelijk gevoelig / 6,5
 Rauwverkleuring: - / -
 Frietkwaliteit: gemiddeld / 6
 Drogestofverdeling: - / -
 Chipskwaliteit: benedengemiddeld / 5,5
 TGA-gehalte: -

How to grow



www.agricopotatoes.nl

Teeltadvies ¹

Stikstof: standaard advies - 10%.

Fosfaat: standaard advies.

Kalium: standaard advies + 10%.

Pootgoedbehandeling

Goed voorkiemen na het verwijderen van de topspruit kan een positief resultaat geven op de knolzetting. Meer dan eens afkiemen kan een negatief effect hebben op de opbrengst en uniformiteit van de sortering.

Planting distance

28/35 mm: 27 cm (50.000 planten/ha)

35/55 mm: 33 cm (40.000 planten/ha)

Onkruiden

Een standaard dosering Metribuzin (Sencor) vóór en na opkomst geeft geen loof reactie of opbrengstderving.

Schimmels

Een strikt preventief spuitschema wordt geadviseerd.

Oogst

Wacht tenminste drie weken na loofdding, vanwege de gevoeligheid voor rooibeschatiging en/of stootblauw.

Bewaartemperatuur - Bewaarperiode

Geadviseerde bewaartemperatuur is 5 °C. Geschikt voor middellange bewaring.

¹ Bemestingsadvies is gebaseerd op bodemanalyse



Say potato,
say Agrico.

Resistenties

Virus - Bladrol: weinig vatbaar / 6

Virus - Yn: weinig vatbaar / 6

Virus - Yntn (knol): weinig vatbaar / 6

Kringerigheid: weinig vatbaar / 6

Phytophthora loof: vatbaar / 5,5

Phytophthora knol: vatbaar / 5

Fusarium: vatbaar / 5,5

Schurft: vatbaar / 5

Poederschurft: vatbaar / 5

Zwarte spikkel: - / -

Wratziekte F1 (D1): resistent / 10

Wratziekte F6 (O1): - / -

Wratziekte F18 (T1): - / -

Aardappelmoetheid Ro 1/4 (A): - / -

Aardappelmoetheid Ro 2/3 (B/C): - / -

Aardappelmoetheid Pa 2 (D): vatbaar / 2

Aardappelmoetheid Pa 3 (E): vatbaar / 2