TEELTAANBEVELING

Twinner.

Een vroeg aardappelras voor consumptie, geschikt voor gangbare en biologische teelt, met vroeg een goede opbrengst en Phytophthora-tolerantie in loof en knol.

- **Grove knollen**
- **Mooie presentatie**
- **Vrij vastkokend**

Biologisch **Retail** Vers **Traditioneel**



Karakteristieken

Algemene kenmerken

Kweker: G.W. te Winkel
Kruising: MA 98-0032 x AR 00-87-22
Kwekersrecht: 31-12-2046
Zaailing: TW 07-0807

Plant- en knoleigenschappen

Rijptijd: vroeg / 7,5
Kiemkleur: rood paars / RV
Bloemkleur: wit / W
Hoeveelheid bessen: veel / 4,5
Loof - ontwikkeling begin: vrij snel / 7,5
Loof - ontwikkeling volledig: gemiddeld / 7
Loof - stevigheid plant: vrij stevig / 7
Schilkleur: geel / Y
Vleeskleur: geel / 7
Schilhoedanigheid: goed / 7
Knolvorm: ovaal / O
Regelmaat knolvorm: regelmatig / 7
Knolzetting: vrij laag / 5
Knolgrootte: vrij grof / 7,5
Regelmaat sortering: vrij regelmatig / 6,5
Kiemrust: gemiddeld / 6

Gevoeligheid en kwaliteit

Doorwas: redelijk gevoelig / 6,5
Blauwgevoeligheid: weinig gevoelig / 7,5
Groeischeuren: weinig gevoelig / 7
Rooibeschadiging: redelijk gevoelig / 6,5
Ethyleen: 15% tot 25% meer knollen / 7
Talent: 25% meer knollen / 8
Onderwatergewicht: 359
Drogestofgehalte: 19,7%
Kooktype: vrij vastkokend / AB
Grauwverkleuring (na koken): redelijk gevoelig / 6,5
Rauwverkleuring: redelijk gevoelig / 6
Frietkwaliteit: bovengemiddeld / 6,5
Drogestofverdeling: uitstekend / 8
Chipskwaliteit: niet geschikt / 5
TGA-gehalte (mg/100 gr): 7,8 mg/100g

Agrico stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele schadelijke gevolgen die kunnen ontstaan bij het gebruik maken van de gegevens.

AGRICO

TEELTAANBEVELING

Teeltadvies

www.agricopotatoes.nl

Teeltadvies [1]

Stikstof: standaard advies + 15%.Bij voorkeur een gedeelde gift en de tweede gift kort na knolzetting.

Fosfaat: standaard advies.

Kalium: standaard advies.

Pootgoedbehandeling

Kan direct uit de koelcel geplant worden, bij voorkeur na een korte warmtestoot.Plant bij voorkeur als de grond iets is opgewarmd, aangezien dit ras een wat trage beginontwikkeling heeft.

Plantafstand

28/35 mm: 22 cm (60.500 planten/ha)
35/50 mm: 25 cm (54.000 planten/ha)

[1] Bemestingsadvies is gebaseerd op bodemanalyse

Schimmels

Ondanks de phytophthora resistentie, blijf alert voor infecties.

Oogst

Wacht tenminste twee weken na loofdoding, vanwege de gevoeligheid voor rooibeschadiging en/of stootblauw.

Bewaartemperatuur - Bewaarperiode

Geadviseerde bewaartemperatuur is 5 °C. Geschikt voor middellange bewaring.



Say potato, say Agrico.

Resistenties

Virus - Bladrol: - / -
Virus - Yn: weinig vatbaar / 6,5
Virus - Yntn (knol): vatbaar / 5
Kringerigheid: weinig vatbaar / 6
Phytophthora loof: weinig tot niet vatbaar / 8
Phytophthora knol: weinig tot niet vatbaar / 9
Fusarium: weinig vatbaar / 6
Schurft: vatbaar / 5,5

Poederschurft: zeer vatbaar / 4
Zwarte spikkel: weinig vatbaar / 6,5
Wratziekte F1 (D1): resistent / 10
Wratziekte F6 (O1): - / -
Wratziekte F18 (T1): - / -
Aardappelmoeheid Ro 1/4 (A): resistent / 9
Aardappelmoeheid Ro 2/3 (B/C): - / -
Aardappelmoeheid Pa 2 (D): - / -
Aardappelmoeheid Pa 3 (E): - / -

Agrico • Duit 15 • 8305 BB Emmeloord +31 (0)527 639911 info@agrico.nl agricopotatoes.nl