TEELTAANBEVELING

Twister.

Een middenvroeg aardappelras voor consumptie, geschikt voor gangbare en biologische teelt, met een goede opbrengst en Phytophthora-tolerantie in loof en knol.

- **Phytophthoraresistent**
- **Goede schilhoedanigheid**
- **Goede bewaarbaarheid**
- **Goede resistentie tegen virussen**

Biologisch **Retail** Vers **Traditioneel**



Karakteristieken

Algemene kenmerken

Kweker: G.W. te Winkel
Kruising: ARG 96-0739 x AR 02-9113
Kwekersrecht: 31-12-2048
Zaailing: TW 08-1507

Plant- en knoleigenschappen

Rijptijd: middenvroeg / 7
Kiemkleur: rood paars / RV
Bloemkleur: licht paars / LP
Hoeveelheid bessen: bovengemiddeld / 5,5
Loof - ontwikkeling begin: vrij snel / 7
Loof - ontwikkeling volledig: vrij goed / 7,5
Loof - stevigheid plant: vrij stevig / 7
Schilkleur: geel / Y
Vleeskleur: lichtgeel / 6,5
Schilhoedanigheid: goed / 7
Knolvorm: rond ovaal / RO
Regelmaat knolvorm: regelmatig / 7
Knolzetting: gemiddeld / 6,5
Knolgrootte: vrij grof / 7
Regelmaat sortering: vrij regelmatig / 6,5
Kiemrust: vrij lang / 7

Gevoeligheid en kwaliteit

Doorwas: redelijk gevoelig / 6,5
Blauwgevoeligheid: weinig tot niet gevoelig / 8
Groeischeuren: redelijk gevoelig / 6,5
Rooibeschadiging: weinig gevoelig / 7
Ethyleen: 5% minder knollen / 4
Talent: 15% tot 25% meer knollen / 7
Onderwatergewicht: 345
Drogestofgehalte: 19%
Kooktype: vrij vastkokend / AB
Grauwverkleuring (na koken): redelijk gevoelig / 6,5
Rauwverkleuring: redelijk gevoelig / 6
Frietkwaliteit: niet geschikt / 5
Drogestofverdeling: - / -
Chipskwaliteit: niet geschikt / 4
TGA-gehalte (mg/100 gr): 5,63 mg/100g

Agrico stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele schadelijke gevolgen die kunnen ontstaan bij het gebruik maken van de gegevens.

AGRICO

TEELTAANBEVELING

Teeltadvies

www.agricopotatoes.nl

Teeltadvies [1]

Stikstof: standaard advies + 20%.
Fosfaat: standaard advies.
Kalium: standaard advies.

Pootgoedbehandeling

Kan direct uit de koelcel geplant worden, bij voorkeur na een korte warmtestoot.Eén keer afkiemen is optioneel.

Plantafstand

28/35 mm: 22 cm (60.500 planten/ha)
35/50 mm: 25 cm (54.000 planten/ha)

Schimmels

Ondanks de phytophthora resistentie, blijf alert voor infecties.

Oogst

Wacht tenminste twee weken na loofdoding, vanwege de gevoeligheid voor rooibeschadiging en/of stootblauw.

Bewaartemperatuur - Bewaarperiode

Geadviseerde bewaartemperatuur is 6 °C. Geschikt voor middellange tot lange bewaring.

[1] Bemestingsadvies is gebaseerd op bodemanalyse



Say potato, say Agrico.

Resistenties

Virus - Bladrol: - / -
Virus - Yn: weinig tot niet vatbaar / 8
Virus - Yntn (knol): weinig tot niet vatbaar / 8
Kringerigheid: weinig vatbaar / 6
Phytophthora loof: weinig tot niet vatbaar / 9
Phytophthora knol: weinig tot niet vatbaar / 9
Fusarium: weinig vatbaar / 6
Schurft: weinig vatbaar / 6

Poederschurft: vatbaar / 5
Zwarte spikkel: weinig vatbaar / 7
Wratziekte F1 (D1): licht vatbaar / 8
Wratziekte F6 (O1): - / -
Wratziekte F18 (T1): - / -
Aardappelmoeheid Ro 1/4 (A): resistent / 9
Aardappelmoeheid Ro 2/3 (B/C): - / -
Aardappelmoeheid Pa 2 (D): - / -
Aardappelmoeheid Pa 3 (E): - / -

Agrico • Duit 15 • 8305 BB Emmeloord +31 (0)527 639911 info@agrico.nl agricopotatoes.nl