

# Twister.

Een middenvroeg aardappelras voor consumptie, geschikt voor gangbare en biologische teelt, met een goede opbrengst en Phytophthora-tolerantie in loof en knol.



Biologisch



Retail  
Vers



Traditioneel



- ▶ **Phytophthoraresistent**
- ▶ **Goede schilhoedanigheid**
- ▶ **Goede bewaarbaarheid**
- ▶ **Goede resistentie tegen virussen**

## characteristics

### Algemene kenmerken

Kweker: G.W. te Winkel

Kruising: ARG 96-0739 x AR 02-9113

Kwekersrecht: 31-12-2048

Zaailing: TW 08-1507

### Plant- en knoleigenschappen

Rijptijd: middenvroeg / 7

Kiemkleur: rood paars / RV

Bloemkleur: licht paars / LP

Hoeveelheid bessen: bovengemiddeld / 5,5

Loof - ontwikkeling begin: vrij snel / 7

Loof - ontwikkeling volledig: vrij goed / 7,5

Loof - stevigheid plant: vrij stevig / 7

Schilkleur: geel / Y

Vleeskleur: lichtgeel / 6,5

Schilhoedanigheid: goed / 7

Knolvorm: rond ovaal / RO

Regelmaat knolvorm: regelmatig / 7

Knolzetting: gemiddeld / 6,5

Knolgrootte: vrij grof / 7

Regelmaat sortering: vrij regelmatig / 6,5

Kiemrust: vrij lang / 7

### Gevoeligheid en kwaliteit

Doorwas: redelijk gevoelig / 6,5

Blauwgevoeligheid: weinig tot niet gevoelig / 8

Groeischeuren: redelijk gevoelig / 6,5

Roibeschatiging: weinig gevoelig / 7

Ethyleen: 5% minder knollen / 4

Talent: 15% tot 25% meer knollen / 7

Onderwatergewicht: 345

Drogestofgehalte: 19%

Kooktype: vrij vastkokend / AB

Grauwverkleuring (na koken): redelijk gevoelig / 6,5

Rauwverkleuring: redelijk gevoelig / 6

Frietkwaliteit: niet geschikt / 5

Drogestofverdeling: - / -

Chipskwaliteit: niet geschikt / 4

TGA-gehalte: 5,63

# How to grow



[www.agricopotatoes.com](http://www.agricopotatoes.com)

## Teeltadvies <sup>1</sup>

Stikstof: standaard advies + 20%.

Fosfaat: standaard advies.

Kalium: standaard advies.

## Pootgoedbehandeling

Kan direct uit de koelcel geplant worden, bij voorkeur na een korte warmtestoot. Eén keer afkiemen is optioneel.

## Planting distance

28/35 mm: 22 cm (60.500 planten/ha)

35/50 mm: 25 cm (54.000 planten/ha)

## Onkruiden

Gebruik geen Metribuzin (Sencor). Dit geeft een ernstige loofreactie en opbrengstderving.

## Schimmels

Ondanks de phytophthora resistentie, blijf alert voor infecties.

## Oogst

Wacht tenminste twee weken na loofdoding, vanwege de gevoeligheid voor rooibeschatiging en/of stootblauw.

## Bewaartemperatuur - Bewaarperiode

Geadviseerde bewaartemperatuur is 6 °C. Geschikt voor middellange tot lange bewaring.

<sup>1</sup> Bemestingsadvies is gebaseerd op bodemanalyse



Say potato,  
say Agrico.

## Resistenties

Virus - Bladrol: - / -

Virus - Yn: weinig tot niet vatbaar / 8

Virus - Yntn (knol): weinig tot niet vatbaar / 8

Kringerigheid: weinig vatbaar / 6

Phytophthora loof: weinig tot niet vatbaar / 9

Phytophthora knol: weinig tot niet vatbaar / 9

Fusarium: weinig vatbaar / 6

Schurft: weinig vatbaar / 6

Poederschurft: vatbaar / 5

Zwarte spikkel: weinig vatbaar / 7

Wratziekte F1 (D1): licht vatbaar / 8

Wratziekte F6 (O1): - / -

Wratziekte F18 (T1): - / -

Aardappelmoetheid Ro 1/4 (A): resistent / 9

Aardappelmoetheid Ro 2/3 (B/C): - / -

Aardappelmoetheid Pa 2 (D): - / -

Aardappelmoetheid Pa 3 (E): - / -