

Twister.

Een middenvroeg aardappelras voor consumptie, geschikt voor gangbare en biologische teelt, met een goede opbrengst en Phytophthora-tolerantie in loof en knol.



Biologisch



Retail
Vers



Traditioneel



- ▶ **Phytophthoraresistent**
- ▶ **Goede schilhoedanigheid**
- ▶ **Goede bewaarbaarheid**
- ▶ **Goede resistentie tegen virussen**

characteristics

Algemene kenmerken

Kweker: G.W. te Winkel

Kruising: ARG 96-0739 x AR 02-9113

Kwekersrecht: 31-12-2048

Zaailing: TW 08-1507

Plant- en knoleigenschappen

Rijptijd: middenvroeg / 7

Kiemkleur: rood paars / RV

Bloemkleur: licht paars / LP

Hoeveelheid bessen: bovengemiddeld / 5,5

Loof - ontwikkeling begin: vrij snel / 7

Loof - ontwikkeling volledig: vrij goed / 7,5

Loof - stevigheid plant: vrij stevig / 7

Schilkleur: geel / Y

Vleeskleur: lichtgeel / 6,5

Schilhoedanigheid: goed / 7

Knolvorm: rond ovaal / RO

Regelmaat knolvorm: regelmatig / 7

Knolzetting: gemiddeld / 6,5

Knolgrootte: vrij grof / 7

Regelmaat sortering: vrij regelmatig / 6,5

Kiemrust: vrij lang / 7

Gevoeligheid en kwaliteit

Doorwas: redelijk gevoelig / 6,5

Blauwgevoeligheid: weinig tot niet gevoelig / 8

Groeischeuren: redelijk gevoelig / 6,5

Roibeschatiging: weinig gevoelig / 7

Ethyleen: 5% minder knollen / 4

Talent: 15% tot 25% meer knollen / 7

Onderwatergewicht: 345

Drogestofgehalte: 19%

Kooktype: vrij vastkokend / AB

Grauwverkleuring (na koken): redelijk gevoelig / 6,5

Rauwverkleuring: redelijk gevoelig / 6

Frietkwaliteit: niet geschikt / 5

Drogestofverdeling: - / -

Chipskwaliteit: niet geschikt / 4

TGA-gehalte: 5,63

How to grow



www.agricopotatoes.nl

Teeltadvies ¹

Stikstof: standaard advies + 20%.

Fosfaat: standaard advies.

Kalium: standaard advies.

Pootgoedbehandeling

Kan direct uit de koelcel geplant worden, bij voorkeur na een korte warmtestoot. Eén keer afkiemen is optioneel.

Planting distance

28/35 mm: 22 cm (60.500 planten/ha)

35/50 mm: 25 cm (54.000 planten/ha)

Onkruiden

Gebruik geen Metribuzin (Sencor). Dit geeft een ernstige loofreactie en opbrengstderving.

Schimmels

Ondanks de phytophthora resistentie, blijf alert voor infecties.

Oogst

Wacht tenminste twee weken na loofdoding, vanwege de gevoeligheid voor rooibeschatiging en/of stootblauw.

Bewaartemperatuur - Bewaarperiode

Geadviseerde bewaartemperatuur is 6 °C. Geschikt voor middellange tot lange bewaring.

¹ Bemestingsadvies is gebaseerd op bodemanalyse



Say potato,
say Agrico.

Resistenties

Virus - Bladrol: - / -

Virus - Yn: weinig tot niet vatbaar / 8

Virus - Yntn (knol): weinig tot niet vatbaar / 8

Kringerigheid: weinig vatbaar / 6

Phytophthora loof: weinig tot niet vatbaar / 9

Phytophthora knol: weinig tot niet vatbaar / 9

Fusarium: weinig vatbaar / 6

Schurft: weinig vatbaar / 6

Poederschurft: vatbaar / 5

Zwarte spikkel: weinig vatbaar / 7

Wratziekte F1 (D1): licht vatbaar / 8

Wratziekte F6 (O1): - / -

Wratziekte F18 (T1): - / -

Aardappelmoetheid Ro 1/4 (A): resistent / 9

Aardappelmoetheid Ro 2/3 (B/C): - / -

Aardappelmoetheid Pa 2 (D): - / -

Aardappelmoetheid Pa 3 (E): - / -