

Vogue.



Traditioneel

Een middenvroeg aardappelras voor consumptie met regelmatige, grove knollen.

- ▶ **Vrij vastkokend**
- ▶ **Grove knollen**
- ▶ **Vroege knolzetting**



characteristics

Algemene kenmerken

Kweker: Konst Research B.V.
 Kruising: MARABEL x AMOROSA
 Kwekersrecht: 31-12-2046
 Zaailing: KO 03-2027

Plant- en knoleigenschappen

Rijptijd: middenvroeg / 6,5
 Kiemkleur: groen rood / GR
 Bloemkleur: wit / W
 Hoeveelheid bessen: zeer veel / 4
 Loof - ontwikkeling begin: vrij snel / 7
 Loof - ontwikkeling volledig: vrij goed / 7,5
 Loof - stevigheid plant: vrij stevig / 7
 Schilkleur: geel / Y
 Vleeskleur: geel / 7
 Schilhoedanigheid: gemiddeld / 6
 Knolvorm: ovaal lang / OL
 Regelmaat knolvorm: regelmatig / 7
 Knolzetting: vrij laag / 5,5
 Knalgrootte: grof / 8
 Regelmaat sortering: regelmatig / 7
 Kiemrust: vrij kort / 5

Gevoeligheid en kwaliteit

Doorwas: redelijk gevoelig / 6,5
 Blauwgevoeligheid: weinig tot niet gevoelig / 8
 Groeischeuren: redelijk gevoelig / 6,5
 Rooibeschatting: redelijk gevoelig / 6
 Ethyleen: 5% minder tot 5% meer knollen / 5
 Talent: 25% meer knollen / 8
 Onderwatergewicht: 311
 Drogestofgehalte: 17,3%
 Kooktype: vrij vastkokend / AB
 Grauwverkleuring (na koken): weinig gevoelig / 7,5
 Rauwverkleuring: - / -
 Frietkwaliteit: niet geschikt / 5
 Drogestofverdeling: - / -
 Chipskwaliteit: niet geschikt / 4
 TGA-gehalte: 3,7

How to grow



www.agricopotatoes.nl

Teeltadvies ¹

Stikstof: standaard advies - 10%. Bij voorkeur een gedeelde gift en de tweede gift kort na knolzetting.

Fosfaat: standaard advies.

Kalium: standaard advies + 10%.

Pootgoedbehandeling

Goed voorkiemen na het verwijderen van de topspruit kan een positief resultaat geven op de knolzetting. Meer dan eens afkiemen kan een negatief effect hebben op de opbrengst en uniformiteit van de sortering.

Planting distance

28/35 mm: 22 cm (60.500 planten/ha)

35/55 mm: 27 cm (50.000 planten/ha)

Onkruiden

Een standaard dosering Metribuzin (Sencor) vóór en na opkomst geeft geen loof reactie of opbrengstderiving.

Schimmels

Een strikt preventief spuitschema is noodzakelijk.

Oogst

Wacht tenminste drie weken na loofddoding, vanwege de gevoeligheid voor rooibeschatiging en/of stootblauw.

Bewaartemperatuur - Bewaarperiode

Geadviseerde bewaartemperatuur is 5 °C. Geschikt voor levering direct vanuit het veld en voor korte bewaring.

¹ Bemestingsadvies is gebaseerd op bodemanalyse



Say potato,
say Agrico.

Resistenties

Virus - Bladrol: - / -

Virus - Yn: weinig vatbaar / 6,5

Virus - Yntn (knol): vatbaar / 5

Kringerigheid: zeer vatbaar / 4

Phytophthora loof: zeer vatbaar / 4

Phytophthora knol: weinig vatbaar / 6

Fusarium: weinig vatbaar / 6,5

Schurft: weinig vatbaar / 6

Poederschurft: zeer vatbaar / 2

Zwarte spikkel: zeer vatbaar / 4,5

Wratziekte F1 (D1): weinig vatbaar / 9

Wratziekte F6 (O1): - / -

Wratziekte F18 (T1): - / -

Aardappelmoetheid Ro 1/4 (A): resistent / 9

Aardappelmoetheid Ro 2/3 (B/C): - / -

Aardappelmoetheid Pa 2 (D): - / -

Aardappelmoetheid Pa 3 (E): - / -