

Sidney (AR 12-1680).



Verwerkende
industrie
Frites

Een middenlaat, crèmevlezig verwerkingsras geschikt voor de hoogwaardige fritesindustrie.

- ▶ Grove knollen
- ▶ Goede virusresistentie
- ▶ Goede drogestofverdeling en dus geschikt voor QSR



characteristics

Algemene kenmerken

Kweker: Agrico Research B.V.
Kruising: LADY ANNA x AR 05-3392
Zaailing: AR 12-1680

Plant- en knoleigenschappen

Rijptijd: middenlaat / 6
Kiemkleur: - / -
Bloemkleur: wit / W
Hoeveelheid bessen: - / -
Loof - ontwikkeling begin: vrij snel / 7
Loof - ontwikkeling volledig: vrij goed / 7,5
Loof - stevigheid plant: vrij stevig / 7,5
Schilkleur: geel / Y
Vleeskleur: wit / 4,5
Schilhoedanigheid: matig / 5
Knolvorm: lang ovaal / LO
Regelmaat knolvorm: vrij regelmatig / 6,5
Knolzetting: gemiddeld / 6
Knolgrootte: vrij grof / 7,5
Regelmaat sortering: vrij regelmatig / 6,5
Kiemrust: gemiddeld / 6,5

Gevoeligheid en kwaliteit

Doorwas: redelijk gevoelig / 6,5
Blauwgevoeligheid: weinig gevoelig / 7,5
Groeischeuren: redelijk gevoelig / 6
Roibeschatiging: weinig gevoelig / 7
Ethyleen: 5% minder tot 5% meer knollen / 5
Talent: 15% tot 25% meer knollen / 7
Onderwatergewicht: 396
Drogestofgehalte: 21,5%
Kooktype: vrij kruimig / B
Grauwverkleuring (na koken): weinig gevoelig / 7
Rauwverkleuring: weinig gevoelig / 7,5
Frietkwaliteit: bovengemiddeld / 6,5
Drogestofverdeling: uitstekend / 8,5
Chipskwaliteit: - / -
TGA-gehalte: 4,3

How to grow



www.agricopotatoes.nl

Teeltadvies ¹

Stikstof: standaard advies. Bij voorkeur een hoge startgift en een eventuele tweede gift.

Fosfaat: standaard advies.

Kalium: standaard advies.

Pootgoedbehandeling

Afkiemen kan een negatief effect hebben op de opbrengst en uniformiteit van de sortering.

Planting distance

28/35 mm: 26 cm (51.000 planten/ha)

35/50 mm: 33 cm (40.000 planten/ha)

50/55 mm: 37 cm (36.000 planten/ha)

Onkruiden

Gebruik geen Metribuzin (Sencor). Dit geeft een ernstige loofreactie en opbrengstderving.

Schimmels

Een strikt preventief spuitschema is noodzakelijk.

Oogst

Wacht tenminste drie weken na loofdding, vanwege de gevoeligheid voor rooibeschatiging en/of stootblauw.

Bewaartemperatuur - Bewaarperiode

Geadviseerde bewaartemperatuur is 5 °C. Voor verwerkingsdoeleinden niet kouder bewaren dan 7 °C. Geschikt voor middellange bewaring.

¹ Bemestingsadvies is gebaseerd op bodemanalyse



Say potato,
say Agrico.

Resistenties

Virus - Bladrol: - / -

Virus - Yn: weinig tot niet vatbaar / 8

Virus - Yntn (knol): weinig vatbaar / 7,5

Kringerigheid: weinig tot niet vatbaar / 8

Phytophthora loof: zeer vatbaar / 4

Phytophthora knol: weinig tot niet vatbaar / 8

Fusarium: weinig vatbaar / 6

Schurft: vatbaar / 5,5

Poederschurft: weinig vatbaar / 6

Zwarte spikkel: vatbaar / 5,5

Wratziekte F1 (D1): zwaar vatbaar* / 1*

Wratziekte F6 (O1): - / -

Wratziekte F18 (T1): - / -

Aardappelmoetheid Ro 1/4 (A): resistent / 9

Aardappelmoetheid Ro 2/3 (B/C): vatbaar / 4

Aardappelmoetheid Pa 2 (D): partieel resistent / 8

Aardappelmoetheid Pa 3 (E): weinig vatbaar / 6