TEELTAANBEVELING

Sidney.

Een middenlaat, crèmevlezig verwerkingsras geschikt voor de hoogwaardige fritesindustrie.

Verwerkende industrie
Frites

- **Grove knollen**
- **Goede virusresistentie**
- **Goede drogestofverdeling en geschikt voor QSR**



Karakteristieken

Algemene kenmerken

Kweker: Agrico Research B.V.
Kruising: LADY ANNA x AR 05-3392
Zaailing: AR 12-1680

Plant- en knoleigenschappen

Rijptijd: middenlaat / 6
Kiemkleur: - / -
Bloemkleur: wit / W
Hoeveelheid bessen: - / -
Loof - ontwikkeling begin: vrij snel / 7
Loof - ontwikkeling volledig: vrij goed / 7,5
Loof - stevigheid plant: vrij stevig / 7,5
Schilkleur: geel / Y
Vleeskleur: crème / 5
Schilhoedanigheid: matig / 5
Knolvorm: lang ovaal / LO
Regelmaat knolvorm: vrij regelmatig / 6,5
Knolzetting: gemiddeld / 6
Knolgrootte: vrij grof / 7,5
Regelmaat sortering: vrij regelmatig / 6,5
Kiemrust: gemiddeld / 6,5

Gevoeligheid en kwaliteit

Doorwas: redelijk gevoelig / 6,5
Blauwgevoeligheid: weinig gevoelig / 7,5
Groeischeuren: redelijk gevoelig / 6,5
Rooibeschadiging: weinig gevoelig / 7
Ethyleen: 5% minder tot 5% meer knollen / 5
Talent: 15% tot 25% meer knollen / 7
Onderwatergewicht: 396
Drogestofgehalte: 21,5%
Kooktype: vrij kruimig / B
Grauwverkleuring (na koken): weinig gevoelig / 7
Rauwverkleuring: weinig gevoelig / 7,5
Frietkwaliteit: uitstekend / 8
Drogestofverdeling: uitstekend / 8,5
Chipskwaliteit: - / -
TGA-gehalte (mg/100 gr): 4,3 mg/100g

Agrico stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele schadelijke gevolgen die kunnen ontstaan bij het gebruik maken van de gegevens.

TEELTAANBEVELING

Teeltadvies

www.agricopotatoes.nl

Teeltadvies [1]

Stikstof: standaard advies.Bij voorkeur een hoge startgift en een eventuele tweede gift.

Fosfaat: standaard advies.

Kalium: standaard advies.

Pootgoedbehandeling

Afkiemen kan een negatief effect hebben op de opbrengst en uniformiteit van de sortering.

Plantafstand

28/35 mm: 26 cm (51.000 planten/ha)
35/50 mm: 33 cm (40.000 planten/ha)
50/55 mm: 37 cm (36.000 planten/ha)
Cut 50/60 mm: 34 cm (39.000 plants/ha)

Schimmels

Een strikt preventief spuitschema is noodzakelijk.

Oogst

Wacht tenminste drie weken na loofdoding, vanwege de gevoeligheid voor rooibeschadiging en/of stootblauw.

Bewaartemperatuur - Bewaarperiode

Geadviseerde bewaartemperatuur is 5 °C. Voor verwerkingsdoeleinden niet kouder bewaren dan 7 °C. Geschikt voor middellange bewaring.

[1] Bemestingsadvies is gebaseerd op bodemanalyse



Say potato, say Agrico.

Resistenties

Virus - Bladrol: - / -
Virus - Yn: weinig tot niet vatbaar / 8
Virus - Yntn (knol): weinig vatbaar / 7,5
Kringerigheid: weinig tot niet vatbaar / 8
Phytophthora loof: zeer vatbaar / 4
Phytophthora knol: weinig tot niet vatbaar / 8
Fusarium: weinig vatbaar / 6
Schurft: vatbaar / 5,5
Poederschurft: weinig vatbaar / 6
Zwarte spikkel: vatbaar / 5,5
Wratziekte F1 (D1): zwaar vatbaar* / 1*
Wratziekte F6 (O1): - / -
Wratziekte F18 (T1): - / -
Aardappelmoeheid Ro 1/4 (A): resistent / 9
Aardappelmoeheid Ro 2/3 (B/C): vatbaar / 4
Aardappelmoeheid Pa 2 (D): partieel resistent / 8
Aardappelmoeheid Pa 3 (E): weinig vatbaar / 6

Agrico • Duit 15 • 8305 BB Emmeloord +31 (0)527 639911 info@agrico.nl agricopotatoes.nl