

Leonore (AR 13-1059).

Een vroeg aardappelras voor verwerking met vroeg een goede opbrengst en een hoog drogestofgehalte.




**Verwerkende
industrie**
Frites



Traditioneel

- ▶ **Vroege rijptijd**
- ▶ **Goede virusresistentie**
- ▶ **Langovale knollen met goede schilhoedanigheid**



characteristics

Algemene kenmerken

Kweker: Agrico Research B.V.
Kruising: EXCELLENCY x AR 06-3754
Zaailing: AR 13-1059

Plant- en knoleigenschappen

Rijptijd: vroeg / 7,5
Kiemkleur: - / -
Bloemkleur: wit / W
Hoeveelheid bessen: geen / 8
Loof - ontwikkeling begin: snel / 8
Loof - ontwikkeling volledig: goed / 8
Loof - stevigheid plant: vrij stevig / 7
Schilkleur: geel / Y
Vleeskleur: geel / 7
Schilhoedanigheid: goed / 7
Knolvorm: lang ovaal / LO
Regelmaat knolvorm: vrij regelmatig / 6
Knolzetting: gemiddeld / 6,5
Knolgrootte: vrij grof / 7,5
Regelmaat sortering: vrij regelmatig / 6,5
Kiemrust: gemiddeld / 6

Gevoeligheid en kwaliteit

Doorwas: redelijk gevoelig / 6,5
Blauwgevoeligheid: weinig tot niet gevoelig / 8
Groeischeuren: redelijk gevoelig / 6,5
Roibeschatting: redelijk gevoelig / 6,5
Ethyleen: 5% minder tot 5% meer knollen / 5
Talent: 5% minder tot 5% meer knollen / 5
Onderwatergewicht: 397
Drogestofgehalte: 21,5%
Kooktype: kruimig / BC
Grauwverkleuring (na koken): weinig gevoelig / 7
Rauwverkleuring: zeer gevoelig / 4,5
Frietkwaliteit: goed / 7
Drogestofverdeling: goed / 7,5
Chipskwaliteit: - / -
TGA-gehalte: 6,7

How to grow



www.agricopotatoes.com

Teeltadvies ¹

Stikstof: standaard advies + 10%.

Fosfaat: standaard advies.

Kalium: standaard advies.

Pootgoedbehandeling

Afkiemen kan een negatief effect hebben op de opbrengst en uniformiteit van de sortering.

Planting distance

28/35 mm: 24 cm (55.000 planten/ha)

35/55 mm: 31 cm (42.000 planten/ha)

Het advies is om Leonore wat dieper te poten met een goede rugbedekking om groenverkleuring te voorkomen.

Onkruiden

Een standaard dosering Metribuzin (Sencor) vóór en na opkomst kan enige reactie in het loof veroorzaken maar geeft zelden opbrengstderving.

Schimmels

Een strikt preventief spuitschema is noodzakelijk.

Oogst

Wacht tenminste twee weken na loofdoding, vanwege de gevoeligheid voor rooibeschatiging en/of stootblauw.

Bewaartemperatuur - Bewaarperiode

Geadviseerde bewaartemperatuur is 7 °C. Geschikt voor levering direct vanuit het veld en voor korte bewaring.

¹ Bemestingsadvies is gebaseerd op bodemanalyse



Say potato,
say Agrico.

Resistenties

Virus - Bladrol: - / -

Virus - Yn: weinig vatbaar / 7,5

Virus - Yntn (knol): weinig vatbaar / 6

Kringerigheid: vatbaar / 5,5

Phytophthora loof: zeer vatbaar / 3,5

Phytophthora knol: vatbaar / 5

Fusarium: weinig vatbaar / 6

Schurft: weinig vatbaar / 6

Poederschurft: zeer vatbaar / 3

Zwarte spikkel: vatbaar / 5

Wratziekte F1 (D1): resistent / 10

Wratziekte F6 (O1): - / -

Wratziekte F18 (T1): - / -

Aardappelmoetheid Ro 1/4 (A): resistent / 9

Aardappelmoetheid Ro 2/3 (B/C): - / -

Aardappelmoetheid Pa 2 (D): - / -

Aardappelmoetheid Pa 3 (E): - / -