

# Leonore (AR 13-1059).

Een vroeg aardappelras voor verwerking met vroeg een goede opbrengst en een hoog drogestofgehalte.




**Verwerkende  
industrie**  
Frites



**Traditioneel**

- ▶ **Vroege rijptijd**
- ▶ **Goede virusresistentie**
- ▶ **Langovale knollen met goede schilhoedanigheid**



## characteristics

### Algemene kenmerken

Kweker: Agrico Research B.V.  
Kruising: EXCELLENCY x AR 06-3754  
Zaailing: AR 13-1059

### Plant- en knoleigenschappen

Rijptijd: vroeg / 7,5  
Kiemkleur: - / -  
Bloemkleur: wit / W  
Hoeveelheid bessen: geen / 8  
Loof - ontwikkeling begin: snel / 8  
Loof - ontwikkeling volledig: goed / 8  
Loof - stevigheid plant: vrij stevig / 7  
Schilkleur: geel / Y  
Vleeskleur: geel / 7  
Schilhoedanigheid: goed / 7  
Knolvorm: lang ovaal / LO  
Regelmaat knolvorm: vrij regelmatig / 6  
Knolzetting: gemiddeld / 6,5  
Knolgrootte: vrij grof / 7,5  
Regelmaat sortering: vrij regelmatig / 6,5  
Kiemrust: gemiddeld / 6

### Gevoeligheid en kwaliteit

Doorwas: redelijk gevoelig / 6,5  
Blauwgevoeligheid: weinig tot niet gevoelig / 8  
Groeischeuren: redelijk gevoelig / 6,5  
Roibeschatiging: redelijk gevoelig / 6,5  
Ethyleen: 5% minder tot 5% meer knollen / 5  
Talent: 5% minder tot 5% meer knollen / 5  
Onderwatergewicht: 397  
Drogestofgehalte: 21,5%  
Kooktype: kruimig / BC  
Grauwverkleuring (na koken): weinig gevoelig / 7  
Rauwverkleuring: zeer gevoelig / 4,5  
Frietkwaliteit: goed / 7  
Drogestofverdeling: goed / 7,5  
Chipskwaliteit: - / -  
TGA-gehalte: 6,7

# How to grow



[www.agricopotatoes.nl](http://www.agricopotatoes.nl)

## Teeltadvies <sup>1</sup>

Stikstof: standaard advies + 10%.

Fosfaat: standaard advies.

Kalium: standaard advies.

## Pootgoedbehandeling

Afkiemen kan een negatief effect hebben op de opbrengst en uniformiteit van de sortering.

## Planting distance

28/35 mm: 24 cm (55.000 planten/ha)

35/55 mm: 31 cm (42.000 planten/ha)

Het advies is om Leonore wat dieper te poten met een goede rugbedekking om groenverkleuring te voorkomen.

## Onkruiden

Een standaard dosering Metribuzin (Sencor) vóór en na opkomst kan enige reactie in het loof veroorzaken maar geeft zelden opbrengstderving.

## Schimmels

Een strikt preventief spuitschema is noodzakelijk.

## Oogst

Wacht tenminste twee weken na loofdoding, vanwege de gevoeligheid voor rooibeschatiging en/of stootblauw.

## Bewaartemperatuur - Bewaarperiode

Geadviseerde bewaartemperatuur is 7 °C. Geschikt voor levering direct vanuit het veld en voor korte bewaring.

<sup>1</sup> Bemestingsadvies is gebaseerd op bodemanalyse



Say potato,  
say Agrico.

## Resistenties

Virus - Bladrol: - / -

Virus - Yn: weinig vatbaar / 7,5

Virus - Yntn (knol): weinig vatbaar / 6

Kringrigheid: vatbaar / 5,5

Phytophthora loof: zeer vatbaar / 3,5

Phytophthora knol: vatbaar / 5

Fusarium: weinig vatbaar / 6

Schurft: weinig vatbaar / 6

Poederschurft: zeer vatbaar / 3

Zwarte spikkel: vatbaar / 5

Wratziekte F1 (D1): resistent / 10

Wratziekte F6 (O1): - / -

Wratziekte F18 (T1): - / -

Aardappelmoetheid Ro 1/4 (A): resistent / 9

Aardappelmoetheid Ro 2/3 (B/C): - / -

Aardappelmoetheid Pa 2 (D): - / -

Aardappelmoetheid Pa 3 (E): - / -