


Fajah.

Een sterk aardappelras voor consumptie met grove knollen, regelmatige sortering en een redelijk hoog onderwatergewicht.

- ▶ **Grove knollen en hoge opbrengst**
- ▶ **Langovale regelmatige knollen**
- ▶ **Korte kiemrust, geschikt voor tweede teelt**



Traditioneel

characteristics

Algemene kenmerken

Kweker: R. Rispens
 Kruising: LANORMA x AMBITION
 Kwekersrecht: 31-12-2052
 Zaailing: RP 10-1003

Plant- en knoleigenschappen

Rijptijd: middenlaat / 5,5
 Kiemkleur: rood / R
 Bloemkleur: wit / W
 Hoeveelheid bessen: benedengemiddeld / 7
 Loof - ontwikkeling begin: snel / 8
 Loof - ontwikkeling volledig: goed / 8
 Loof - stevigheid plant: vrij stevig / 7,5
 Schilkleur: geel / Y
 Vleeskleur: lichtgeel / 6
 Schilhoedanigheid: bovengemiddeld / 6,5
 Knolvorm: lang ovaal / LO
 Regelmaat knolvorm: regelmatig / 7
 Knolzetting: gemiddeld / 6
 Knalgrootte: vrij grof / 7,5
 Regelmaat sortering: vrij regelmatig / 6,5
 Kiemrust: vrij kort / 5,5

Gevoeligheid en kwaliteit

Doorwas: redelijk gevoelig / 6,5
 Blauwgevoeligheid: weinig gevoelig / 7
 Groeischeuren: redelijk gevoelig / 6,5
 Rooibeschatiging: gevoelig / 5
 Ethyleen: 15% tot 25% meer knollen / 7
 Talent: 25% meer knollen / 8
 Onderwatergewicht: 354
 Drogestofgehalte: 19,4%
 Kooktype: kruimig / BC
 Grauwverkleuring (na koken): redelijk gevoelig / 6,5
 Rauwverkleuring: redelijk gevoelig / 6
 Frietkwaliteit: goed / 7
 Drogestofverdeling: - / -
 Chipskwaliteit: bovengemiddeld / 6,5
 TGA-gehalte: 4,5

How to grow



www.agricopotatoes.com

Teeltadvies ¹

Stikstof: standaard advies + 10%.

Fosfaat: standaard advies.

Kalium: standaard advies.

Pootgoedbehandeling

Afkiemen kan een negatief effect hebben op de opbrengst en uniformiteit van de sortering.

Planting distance

28/35 mm: 27 cm (50.000 planten/ha)

35/55 mm: 33 cm (40.000 planten/ha)

Onkruiden

Een standaard dosering Metribuzin (Sencor) vóór en na opkomst kan enige reactie in het loof veroorzaken en kan enige opbrengstderving geven.

Schimmels

Een strikt preventief spuitschema is noodzakelijk.

Oogst

Wacht tenminste twee weken na loofdoding, vanwege de gevoeligheid voor rooibeschatiging en/of stootblauw.

Bewaartemperatuur - Bewaarperiode

Geadviseerde bewaartemperatuur is 5 °C. Geschikt voor middellange bewaring.

¹ Bemestingsadvies is gebaseerd op bodemanalyse



Say potato,
say Agrico.

Resistenties

Virus - Bladrol: - / -

Virus - Yn: vatbaar / 5,5

Virus - Yntn (knol): weinig vatbaar / 6,5

Kringerigheid: vatbaar / 5

Phytophthora loof: zeer vatbaar / 4

Phytophthora knol: vatbaar / 5,5

Fusarium: vatbaar / 5,5

Schurft: vatbaar / 5

Poederschurft: - / -

Zwarte spikkel: vatbaar / 5,5

Wratziekte F1 (D1): zwaar vatbaar* / 1*

Wratziekte F6 (O1): - / -

Wratziekte F18 (T1): - / -

Aardappelmoetheid Ro 1/4 (A): resistent / 9

Aardappelmoetheid Ro 2/3 (B/C): - / -

Aardappelmoetheid Pa 2 (D): vatbaar / 3

Aardappelmoetheid Pa 3 (E): vatbaar / 2