TEELTAANBEVELING

Picasso.

Een laat aardappelras voor consumptie met een gele schil, aansprekende rode ogen, goede schurftresistentie en zeer geschikt voor lange bewaring.

- **Hoge opbrengst**
- **Goede droogtetolerantie**
- **Weinig gevoelig voor blauw en beschadiging**

Traditioneel



Karakteristieken

Algemene kenmerken

Kweker: Duoplant V.O.F.
Kruising: CARA x AUSONIA
Kwekersrecht: Verlopen
Zaailing: HB 81-0036

Plant- en knoleigenschappen

Rijptijd: laat / 5
Kiemkleur: rood paars / RV
Bloemkleur: wit / W
Hoeveelheid bessen: zeer veel / 4
Loof - ontwikkeling begin: gemiddeld / 6,5
Loof - ontwikkeling volledig: goed / 8
Loof - stevigheid plant: vrij stevig / 7,5
Schilkleur: geel met rode ogen / Y/R
Vleeskleur: lichtgeel / 6
Schilhoedanigheid: gemiddeld / 6
Knolvorm: ovaal / O
Regelmaat knolvorm: vrij regelmatig / 6
Knolzetting: gemiddeld / 6
Knolgrootte: grof / 8
Regelmaat sortering: regelmatig / 7
Kiemrust: lang / 8

Gevoeligheid en kwaliteit

Doorwas: redelijk gevoelig / 6,5
Blauwgevoeligheid: weinig gevoelig / 7
Groeischeuren: redelijk gevoelig / 6
Rooibeschadiging: redelijk gevoelig / 6,5
Ethyleen: 5% minder tot 5% meer knollen / 5
Talent: 15% tot 25% meer knollen / 7
Onderwatergewicht: 381
Drogestofgehalte: 20,8%
Kooktype: vrij kruimig / B
Grauwverkleuring (na koken): redelijk gevoelig / 6,5
Rauwverkleuring: - / -
Frietkwaliteit: niet geschikt / 5
Drogestofverdeling: - / -
Chipskwaliteit: niet geschikt / 4
TGA-gehalte (mg/100 gr): 1,9 mg/100g

Agrico stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele schadelijke gevolgen die kunnen ontstaan bij het gebruik maken van de gegevens.

TEELTAANBEVELING

Teeltadvies

www.agricopotatoes.nl

Teeltadvies [1]

Stikstof: standaard advies + 5%.
Fosfaat: standaard advies.
Kalium: standaard advies.

Pootgoedbehandeling

Goed voorkiemen na het verwijderen van de topspruit kan een positief resultaat geven op de knolzetting.Meer dan eens afkiemen kan een negatief effect hebben op de opbrengst en uniformiteit van de sortering.

Plantafstand

28/35 mm: 27 cm (50.000 planten/ha)
35/55 mm: 33 cm (40.000 planten/ha)

Schimmels

Een strikt preventief spuitschema is noodzakelijk.

Oogst

Wacht tenminste twee weken na loofdoding, vanwege de gevoeligheid voor rooibeschadiging en/of stootblauw.

Bewaartemperatuur - Bewaarperiode

Geadviseerde bewaartemperatuur is 5 °C. Geschikt voor lange bewaring.

[1] Bemestingsadvies is gebaseerd op bodemanalyse



Say potato, say Agrico.

Resistenties

Virus - Bladrol: vatbaar / 5
Virus - Yn: weinig tot niet vatbaar / 8
Virus - Yntn (knol): vatbaar / 5
Kringerigheid: vatbaar / 5
Phytophthora loof: vatbaar / 5
Phytophthora knol: weinig vatbaar / 7
Fusarium: weinig vatbaar / 7
Schurft: weinig vatbaar / 7

Poederschurft: vatbaar / 5
Zwarte spikkel: - / -
Wratziekte F1 (D1): resistent / 10
Wratziekte F6 (O1): matig vatbaar / 5
Wratziekte F18 (T1): - / -
Aardappelmoeheid Ro 1/4 (A): resistent / 9
Aardappelmoeheid Ro 2/3 (B/C): - / -
Aardappelmoeheid Pa 2 (D): - / -
Aardappelmoeheid Pa 3 (E): - / -

Agrico • Duit 15 • 8305 BB Emmeloord +31 (0)527 639911 info@agrico.nl agricopotatoes.nl