

# Premiere.

Een zeer vroeg aardappelras voor verwerking met vroeg een goede opbrengst.



**Verwerkende  
industrie**  
Frites

- ▶ **Vroeg afluand te verwerken**
- ▶ **Hoog onderwatergewicht**
- ▶ **Goede drogestofverdeling**



## characteristics

### Algemene kenmerken

Kweker: Precardi  
Kruising: CIVA x PROVITA  
Kwekersrecht: Verlopen  
Zaailing: Brands 68-15

### Plant- en knoleigenschappen

Rijptijd: zeer vroeg / 8  
Kiemkleur: rood paars / RV  
Bloemkleur: wit / W  
Hoeveelheid bessen: zeer veel / 4  
Loof - ontwikkeling begin: snel / 8  
Loof - ontwikkeling volledig: vrij goed / 7,5  
Loof - stevigheid plant: gemiddeld / 6  
Schilkleur: geel / Y  
Vleeskleur: lichtgeel / 6  
Schilhoedanigheid: goed / 7  
Knolvorm: ovaal rond / OR  
Regelmaat knolvorm: vrij regelmatig / 6  
Knolzetting: vrij hoog / 7  
Knalgrootte: gemiddeld / 6,5  
Regelmaat sortering: vrij regelmatig / 6  
Kiemrust: vrij kort / 5

### Gevoeligheid en kwaliteit

Doorwas: weinig gevoelig / 7  
Blauwgevoeligheid: redelijk gevoelig / 6  
Groeischeuren: redelijk gevoelig / 6  
Roibeschatiging: redelijk gevoelig / 6  
Ethyleen: - / -  
Talent: 5% tot 15% meer knollen / 6  
Onderwatergewicht: 416  
Drogestofgehalte: 22,4%  
Kooktype: kruimig / BC  
Grauwverkleuring (na koken): redelijk gevoelig / 6,5  
Rauwverkleuring: gevoelig / 5,5  
Frietkwaliteit: bovengemiddeld / 6,5  
Drogestofverdeling: goed / 7,5  
Chipskwaliteit: niet geschikt / 5  
TGA-gehalte: 2,8

# How to grow



[www.agricopotatoes.nl](http://www.agricopotatoes.nl)

## Teeltadvies <sup>1</sup>

Stikstof: standaard advies.

Fosfaat: standaard advies.

Kalium: standaard advies + 10%.

## Pootgoedbehandeling

Kan direct uit de koelcel geplant worden, bij voorkeur na een korte warmtestoot. Afkiemen kan een negatief effect hebben op de opbrengst en uniformiteit van de sortering.

## Planting distance

28/35 mm: 27 cm (50.000 planten/ha)

35/55 mm: 33 cm (40.000 planten/ha)

## Onkruiden

Een standaard dosering Metribuzin (Sencor) voor en na opkomst kan een ernstige reactie in het loof veroorzaken en kan enige opbrengstderving geven.

## Schimmels

Een strikt preventief spuitschema is noodzakelijk.

## Oogst

Wacht tenminste twee weken na loofdoding, vanwege de gevoeligheid voor rooibeschatiging en/of stootblauw.

## Bewaartemperatuur - Bewaarperiode

Geadviseerde bewaartemperatuur is 5 °C. Voor verwerkingsdoeleinden niet kouder bewaren dan 7 °C. Geschikt voor levering direct vanuit het veld en voor korte bewaring.

<sup>1</sup> Bemestingsadvies is gebaseerd op bodemanalyse



Say potato,  
say Agrico.

## Resistenties

Virus - Bladrol: weinig vatbaar / 6

Virus - Yn: vatbaar / 5,5

Virus - Yntn (knol): weinig vatbaar / 7,5

Kringerigheid: weinig tot niet vatbaar / 8

Phytophthora loof: zeer vatbaar / 4

Phytophthora knol: weinig vatbaar / 6

Fusarium: weinig vatbaar / 6

Schurft: zeer vatbaar / 4,5

Poederschurft: vatbaar / 5

Zwarte spikkel: - / -

Wratziekte F1 (D1): resistent / 10

Wratziekte F6 (O1): - / -

Wratziekte F18 (T1): - / -

Aardappelmoetheid Ro 1/4 (A): resistent / 9

Aardappelmoetheid Ro 2/3 (B/C): - / -

Aardappelmoetheid Pa 2 (D): - / -

Aardappelmoetheid Pa 3 (E): - / -