

Riviera.



Traditioneel

Een zeer vroeg aardappelras voor consumptie met een mooie huid, uitstekende hitte- en virusresistenties en vroeg een goede opbrengst.

- ▶ **Grove knollen**
- ▶ **Mooie presentatie**
- ▶ **Goede virusresistenties**



characteristics

Algemene kenmerken

Kweker: Mts. Boerhave
 Kruising: MINERVA x ALCMARIA
 Kwekersrecht: 31-12-2030
 Zaailing: BH 86-0266

Plant- en knoleigenschappen

Rijptijd: zeer vroeg / 8
 Kiemkleur: blauw paars / BV
 Bloemkleur: wit / W
 Hoeveelheid bessen: zeer veel / 4
 Loof - ontwikkeling begin: vrij snel / 7
 Loof - ontwikkeling volledig: gemiddeld / 7
 Loof - stevigheid plant: gemiddeld / 6,5
 Schilkleur: geel / Y
 Vleeskleur: lichtgeel / 6
 Schilhoedanigheid: uitstekend / 8
 Knolvorm: ovaal rond / OR
 Regelmaat knolvorm: vrij regelmatig / 6
 Knolzetting: vrij laag / 5
 Knolgrootte: vrij grof / 7,5
 Regelmaat sortering: regelmatig / 7
 Kiemrust: gemiddeld / 6

Gevoeligheid en kwaliteit

Doorwas: redelijk gevoelig / 6,5
 Blauwgevoeligheid: weinig tot niet gevoelig / 8
 Groeischeuren: redelijk gevoelig / 6,5
 Rooibeschatting: redelijk gevoelig / 6
 Ethyleen: 5% tot 15% meer knollen / 6
 Talent: 5% minder knollen / 4
 Onderwatergewicht: 318
 Drogestofgehalte: 17,7%
 Kooktype: vrij vastkokend / AB
 Grauwverkleuring (na koken): gevoelig / 5,5
 Rauwverkleuring: - / -
 Frietkwaliteit: niet geschikt / 4,5
 Drogestofverdeling: - / -
 Chipskwaliteit: niet geschikt / 4
 TGA-gehalte: 4,8

How to grow



www.agricopotatoes.nl

Teeltadvies ¹

Stikstof: standaard advies + 10%.

Fosfaat: standaard advies.

Kalium: standaard advies.

Pootgoedbehandeling

Goed voorkiemen na het verwijderen van de topspruit kan een positief resultaat geven op de knolzetting. Meer dan eens afkiemen kan een negatief effect hebben op de opbrengst en uniformiteit van de sortering.

Planting distance

28/35 mm: 22 cm (60.500 planten/ha)

35/55 mm: 27 cm (50.000 planten/ha)

Onkruiden

Een standaard dosering Metribuzin (Sencor) vóór en na opkomst geeft geen loof reactie of opbrengstderiving.

Schimmels

Een strikt preventief spuitschema is noodzakelijk.

Oogst

Wacht tenminste twee weken na loofdoding, vanwege de gevoeligheid voor rooibeschatiging en/of stootblauw.

Bewaartemperatuur - Bewaarperiode

Geadviseerde bewaartemperatuur is 4 °C. Geschikt voor levering direct vanuit het veld en voor korte bewaring.

¹ Bemestingsadvies is gebaseerd op bodemanalyse



Say potato,
say Agrico.

Resistenties

Virus - Bladrol: weinig vatbaar / 7

Virus - Yn: weinig tot niet vatbaar / 8

Virus - Yntn (knol): weinig vatbaar / 7

Kringerigheid: zeer vatbaar / 4

Phytophthora loof: zeer vatbaar / 3

Phytophthora knol: vatbaar / 5

Fusarium: weinig vatbaar / 6

Schurft: vatbaar / 5,5

Poederschurft: zeer vatbaar / 2

Zwarte spikkel: vatbaar / 5,5

Wratziekte F1 (D1): resistent / 10

Wratziekte F6 (O1): - / -

Wratziekte F18 (T1): - / -

Aardappelmoetheid Ro 1/4 (A): resistent / 9

Aardappelmoetheid Ro 2/3 (B/C): - / -

Aardappelmoetheid Pa 2 (D): - / -

Aardappelmoetheid Pa 3 (E): - / -