


# Rudolph.



Traditioneel

Een middenlaat, roodschillig en witvlezig aardappelras voor consumptie met een goede hiteresistentie en een zeer hoge opbrengst.

- ▶ **Witte vleeskleur**
- ▶ **Grove knollen**
- ▶ **Goede bewaarbaarheid**



## characteristics

### Algemene kenmerken

Kweker: Agrico Research B.V.  
 Kruising: CHIEFTAIN x STIRLING  
 Kwekersrecht: 31-12-2035  
 Zaailing: UK 93-1-2

### Plant- en knoleigenschappen

Rijptijd: middenlaat / 5,5  
 Kiemkleur: rood paars / RV  
 Bloemkleur: licht paars / LP  
 Hoeveelheid bessen: gemiddeld / 6  
 Loof - ontwikkeling begin: gemiddeld / 6  
 Loof - ontwikkeling volledig: goed / 8  
 Loof - stevigheid plant: stevig / 8  
 Schilkleur: rood / R  
 Vleeskleur: wit / 4  
 Schilhoedanigheid: goed / 7  
 Knolvorm: ovaal rond / OR  
 Regelmaat knolvorm: vrij regelmatig / 6  
 Knolzetting: vrij laag / 5  
 Knolgrootte: grof / 8  
 Regelmaat sortering: regelmatig / 7  
 Kiemrust: vrij lang / 7

### Gevoeligheid en kwaliteit

Doorwas: redelijk gevoelig / 6,5  
 Blauwgevoeligheid: weinig gevoelig / 7  
 Groeischeuren: redelijk gevoelig / 6  
 Rooibeschatting: redelijk gevoelig / 6  
 Ethyleen: 5% tot 15% meer knollen / 6  
 Talent: 15% tot 25% meer knollen / 7  
 Onderwatergewicht: 376  
 Drogestofgehalte: 20,5%  
 Kooktype: vrij vastkokend / AB  
 Grauwverkleuring (na koken): redelijk gevoelig / 6,5  
 Rauwverkleuring: - / -  
 Frietkwaliteit: bovengemiddeld / 6,5  
 Drogestofverdeling: - / -  
 Chipskwaliteit: benedengemiddeld / 5,5  
 TGA-gehalte: 5,5

# How to grow



[www.agricopotatoes.nl](http://www.agricopotatoes.nl)

## Teeltadvies <sup>1</sup>

**Stikstof:** standaard advies + 5%. Bij voorkeur een gedeelde gift en de tweede gift kort na knolzetting.

**Fosfaat:** standaard advies.

**Kalium:** standaard advies + 10%.

## Pootgoedbehandeling

Een korte warmtestoot of goed voorkiemen wordt aanbevolen. Goed voorkiemen na het verwijderen van de topspruit kan een positief resultaat geven op de knolzetting. Eén keer afkiemen is optioneel.

## Planting distance

28/35 mm: 25 cm (54.000 planten/ha)

35/55 mm: 33 cm (40.000 planten/ha)

<sup>1</sup> Bemestingsadvies is gebaseerd op bodemanalyse

## Onkruiden

Een standaard dosering Metribuzin (Sencor) vóór en na opkomst kan enige reactie in het loof veroorzaken en kan enige opbrengstderving geven.

## Schimmels

Een strikt preventief spuitschema is noodzakelijk.

## Oogst

Wacht tenminste drie weken na loofdoding, vanwege de gevoeligheid voor rooibeschatiging en/of stootblauw.

## Bewaartemperatuur - Bewaarperiode

Geadviseerde bewaartemperatuur is 5 °C. Voor verwerkingsdoeleinden niet kouder bewaren dan 7 °C. Geschikt voor lange bewaring.



Say potato,  
say Agrico.

## Resistenties

Virus - Bladrol: - / -

Virus - Yn: vatbaar / 5

Virus - Yntn (knol): weinig vatbaar / 7

Kringerigheid: weinig vatbaar / 7

Phytophthora loof: vatbaar / 5,5

Phytophthora knol: vatbaar / 5,5

Fusarium: weinig vatbaar / 6

Schurft: vatbaar / 5

Poederschurft: weinig vatbaar / 7

Zwarte spikkel: weinig vatbaar / 7

Wratziekte F1 (D1): resistent / 10

Wratziekte F6 (O1): licht vatbaar / 8

Wratziekte F18 (T1): - / -

Aardappelmoetheid Ro 1/4 (A): - / -

Aardappelmoetheid Ro 2/3 (B/C): - / -

Aardappelmoetheid Pa 2 (D): - / -

Aardappelmoetheid Pa 3 (E): - / -