

# Sante.

Een middenlaat aardappelras voor consumptie met een goede opbrengst.



**Retail**  
Vers



**Traditioneel**

- ▶ **Hoog onderwatergewicht**
- ▶ **Vrij kruimig**
- ▶ **Brede resistenties**



## characteristics

### Algemene kenmerken

Kweker: J. Vegter

Kruising: WY 66-13-636 x AM 66-0042

Kwekersrecht: Verlopen

Zaailing: VE 72-13-225

### Plant- en knoleigenschappen

Rijptijd: middenlaat / 6

Kiemkleur: rood paars / RV

Bloemkleur: wit / W

Hoeveelheid bessen: zeer veel / 4

Loof - ontwikkeling begin: vrij snel / 7

Loof - ontwikkeling volledig: vrij goed / 7,5

Loof - stevigheid plant: vrij stevig / 7

Schilkleur: geel / Y

Vleeskleur: lichtgeel / 6

Schilhoedanigheid: gemiddeld / 6

Knolvorm: ovaal rond / OR

Regelmaat knolvorm: vrij regelmatig / 6

Knolzetting: vrij hoog / 7

Knolgrootte: vrij grof / 7

Regelmaat sortering: vrij regelmatig / 6,5

Kiemrust: gemiddeld / 6

### Gevoeligheid en kwaliteit

Doorwas: redelijk gevoelig / 6,5

Blauwgevoeligheid: weinig gevoelig / 7,5

Groeischeuren: redelijk gevoelig / 6,5

Roibeschatiging: redelijk gevoelig / 6

Ethyleen: - / -

Talent: 5% minder knollen / 4

Onderwatergewicht: 425

Drogestofgehalte: 22,9%

Kooktype: vrij kruimig / B

Grauwverkleuring (na koken): gevoelig / 5,5

Rauwverkleuring: - / -

Frietkwaliteit: gemiddeld / 6

Drogestofverdeling: - / -

Chipskwaliteit: niet geschikt / 5

TGA-gehalte: 3,9

# How to grow



[www.agricopotatoes.nl](http://www.agricopotatoes.nl)

## Teeltadvies <sup>1</sup>

Stikstof: standaard advies.

Fosfaat: standaard advies.

Kalium: standaard advies.

## Pootgoedbehandeling

Goed voorkiemen na het verwijderen van de topspruit kan een positief resultaat geven op de knolzetting. Meer dan eens afkiemen kan een negatief effect hebben op de opbrengst en uniformiteit van de sortering.

## Planting distance

28/35 mm: 25 cm (54.000 planten/ha)

35/55 mm: 30 cm (45.000 planten/ha)

## Onkruiden

Een standaard dosering Metribuzin (Sencor) voor en na opkomst kan enige reactie in het loof veroorzaken en kan enige opbrengstderving geven.

## Schimmels

Een strikt preventief spuitschema is noodzakelijk.

## Oogst

Wacht tenminste twee weken na loofdoding, vanwege de gevoeligheid voor rooibeschatiging en/of stootblauw.

## Bewaartemperatuur - Bewaarperiode

Geadviseerde bewaartemperatuur is 5 °C. Geschikt voor middellange bewaring.

<sup>1</sup> Bemestingsadvies is gebaseerd op bodemanalyse



Say potato,  
say Agrico.

## Resistenties

Virus - Bladrol: weinig vatbaar / 7

Virus - Yn: weinig tot niet vatbaar / 8,5

Virus - Yntn (knol): weinig tot niet vatbaar / 9

Kringerigheid: weinig vatbaar / 6

Phytophthora loof: vatbaar / 5

Phytophthora knol: weinig vatbaar / 7

Fusarium: weinig vatbaar / 6

Schurft: vatbaar / 5

Poederschurft: weinig tot niet vatbaar / 8

Zwarte spikkel: vatbaar / 5,5

Wratziekte F1 (D1): resistent / 10

Wratziekte F6 (O1): - / -

Wratziekte F18 (T1): - / -

Aardappelmoetheid Ro 1/4 (A): resistent / 9

Aardappelmoetheid Ro 2/3 (B/C): partieel resistent / 7

Aardappelmoetheid Pa 2 (D): partieel resistent / 7

Aardappelmoetheid Pa 3 (E): vatbaar / 3