

Sevilla.

Een laat aardappelras met een goed onderwatergewicht, heerlijke smaak en natuurlijke bescherming tegen Phytophthora in loof.



Biologisch



Verwerkende
industrie

Frites
Chips

- ▶ **Phytophthora resistentie**
- ▶ **Lage stikstofbehoefte**
- ▶ **Goede droogtetolerantie**



characteristics

Algemene kenmerken

Kweker: N. Vos
Kruising: AGRIA x DOB 1997-507-015
Kwekersrecht: 31-12-2048
Zaailing: VOS 2006-001-001

Plant- en knoleigenschappen

Rijptijd: laat / 4,5
Kiemkleur: - / -
Bloemkleur: paars / P
Hoeveelheid bessen: - / -
Loof - ontwikkeling begin: vrij snel / 7,5
Loof - ontwikkeling volledig: vrij goed / 7,5
Loof - stevigheid plant: vrij stevig / 7,5
Schilkleur: geel / Y
Vleeskleur: geel / 7
Schilhoedanigheid: benedengemiddeld / 5,5
Knolvorm: ovaal / O
Regelmaat knolvorm: vrij regelmatig / 6
Knolzetting: vrij hoog / 7
Knolgrootte: vrij grof / 7
Regelmaat sortering: vrij regelmatig / 6,5
Kiemrust: lang / 8

Gevoeligheid en kwaliteit

Doorwas: redelijk gevoelig / 6
Blauwgevoeligheid: weinig gevoelig / 7
Groeiischeuren: redelijk gevoelig / 6,5
Roibeschatiging: gevoelig / 5,5
Ethyleen: - / -
Talent: - / -
Onderwatergewicht: 385
Drogestofgehalte: 21%
Kooktype: kruimig / C
Grauwverkleuring (na koken): weinig gevoelig / 7,5
Rauwverkleuring: redelijk gevoelig / 6
Frietkwaliteit: zeer goed / 7,5
Drogestofverdeling: goed / 7
Chipskwaliteit: - / -
TGA-gehalte: -

How to grow



www.agricopotatoes.nl

Teeltadvies ¹

Stikstof: standaard advies - 10%.

Fosfaat: standaard advies.

Kalium: standaard advies.

Pootgoedbehandeling

Een korte warmtestoot of goed voorkiemen wordt aanbevolen. Meer dan eens afkiemen kan een negatief effect hebben op de opbrengst en uniformiteit van de sortering.

Planting distance

28/35 mm: 20 cm (67.000 planten/ha)

35/55 mm: 28 cm (48.000 planten/ha)

Onkruiden

Een standaard dosering Metribuzin (Sencor) vóór en na opkomst geeft geen loof reactie of opbrengstderving.

Schimmels

Ondanks de phytophthora resistentie, blijf alert voor infecties.

Oogst

Wacht tenminste drie weken na loofdding, vanwege de gevoeligheid voor rooibeschatiging en/of stootblauw.

Bewaartemperatuur - Bewaarperiode

Geadviseerde bewaartemperatuur is 7 °C. Geschikt voor lange bewaring.

¹ Bemestingsadvies is gebaseerd op bodemanalyse



Say potato,
say Agrico.

Resistenties

Virus - Bladrol: - / -

Virus - Yn: - / -

Virus - Yntn (knol): - / -

Kringerigheid: weinig vatbaar / 6

Phytophthora loof: weinig tot niet vatbaar / 9

Phytophthora knol: - / -

Fusarium: vatbaar / 5

Schurft: zeer vatbaar / 4,5

Poederschurft: - / -

Zwarte spikkel: - / -

Wratziekte F1 (D1): - / -

Wratziekte F6 (O1): - / -

Wratziekte F18 (T1): - / -

Aardappelmoetheid Ro 1/4 (A): - / -

Aardappelmoetheid Ro 2/3 (B/C): - / -

Aardappelmoetheid Pa 2 (D): - / -

Aardappelmoetheid Pa 3 (E): - / -