

Sinora.

Een middenvroeg, goed opbrengend en gemakkelijk te telen aardappelras voor de vroege frites- en chipsteelt.



**Verwerkende
industrie**
Frites
Chips

- ▶ **Vroeg afluand te verwerken**
- ▶ **Hoog onderwatergewicht**
- ▶ **Goede virusresistenties**



characteristics

Algemene kenmerken

Kweker: J. Schilt
Kruising: AGRIA x AM 70-2166
Kwekersrecht: 31-12-2027
Zaailing: SI 85-0482

Plant- en knoleigenschappen

Rijptijd: middenvroeg / 7
Kiemkleur: blauw paars / BV
Bloemkleur: wit / W
Hoeveelheid bessen: zeer veel / 4
Loof - ontwikkeling begin: snel / 8
Loof - ontwikkeling volledig: goed / 8
Loof - stevigheid plant: vrij stevig / 7,5
Schilkleur: geel / Y
Vleeskleur: lichtgeel / 6,5
Schilhoedanigheid: gemiddeld / 6
Knolvorm: ovaal rond / OR
Regelmaat knolvorm: vrij regelmatig / 6
Knolzetting: vrij hoog / 7
Knolgrootte: vrij grof / 7
Regelmaat sortering: regelmatig / 7
Kiemrust: gemiddeld / 6

Gevoeligheid en kwaliteit

Doorwas: redelijk gevoelig / 6,5
Blauwgevoeligheid: redelijk gevoelig / 6,5
Groeiischeuren: redelijk gevoelig / 6,5
Roibeschatiging: zeer gevoelig / 4,5
Ethyleen: - / -
Talent: 15% tot 25% meer knollen / 7
Onderwatergewicht: 416
Drogestofgehalte: 22,6%
Kooktype: vrij kruimig / B
Grauwverkleuring (na koken): gevoelig / 5
Rauwverkleuring: gevoelig / 5
Frietkwaliteit: zeer goed / 7,5
Drogestofverdeling: goed / 7
Chipskwaliteit: goed / 7
TGA-gehalte: 8,2

How to grow



www.agricopotatoes.nl

Teeltadvies ¹

Stikstof: standaard advies + 25%. Het gebruik van organische mest wordt afgeraden.

Fosfaat: standaard advies.

Kalium: standaard advies + 10%.

Pootgoedbehandeling

Goed voorkiemen na het verwijderen van de topspruit kan een positief resultaat geven op de knolzetting. Meer dan twee keer afkiemen kan een negatief effect hebben op de opbrengst en uniformiteit van de sortering.

Planting distance

28/35 mm: 25 cm (54.000 planten/ha)

35/55 mm: 30 cm (45.000 planten/ha)

¹ Bemestingsadvies is gebaseerd op bodemanalyse

Onkruiden

Een standaard dosering Metribuzin (Sencor) vóór en na opkomst geeft geen loof reactie of opbrengstderving.

Schimmels

Een strikt preventief spuitschema is noodzakelijk.

Oogst

Wacht tenminste twee weken na loofdoding, vanwege de gevoeligheid voor rooibeschatiging en/of stootblauw.

Bewaartemperatuur - Bewaarperiode

Geadviseerde bewaartemperatuur is 5 °C. Voor verwerkingsdoeleinden niet kouder bewaren dan 7 °C. Geschikt voor levering direct vanuit het veld en voor korte bewaring.



Say potato,
say Agrico.

Resistenties

Virus - Bladrol: weinig vatbaar / 6

Virus - Yn: weinig vatbaar / 7

Virus - Yntn (knol): weinig vatbaar / 7

Kringerigheid: weinig vatbaar / 6

Phytophthora loof: zeer vatbaar / 4,5

Phytophthora knol: vatbaar / 5

Fusarium: weinig vatbaar / 6

Schurft: vatbaar / 5,5

Poederschurft: vatbaar / 5

Zwarte spikkel: - / -

Wratziekte F1 (D1): - / -

Wratziekte F6 (O1): - / -

Wratziekte F18 (T1): - / -

Aardappelmoetheid Ro 1/4 (A): resistent / 9

Aardappelmoetheid Ro 2/3 (B/C): - / -

Aardappelmoetheid Pa 2 (D): vatbaar / 4

Aardappelmoetheid Pa 3 (E): vatbaar / 2