

# Rosalyn.



Traditioneel

Een middenvroeg consumptieras met een mooie rode schil en een goede opbrengst.

- ▶ **Vroeg een goede opbrengst**
- ▶ **G. pallida en wratziekte resistenties**
- ▶ **Goede schurftresistentie**



## characteristics

### Algemene kenmerken

Kweker: L. Hermus & A.J. van der Linden  
 Kruising: AR 05-1073 x EVOLUTION  
 Kwekersrecht: Aangevraagd  
 Zaailing: HL 12-0801

### Plant- en knoleigenschappen

Rijptijd: middenvroeg / 7  
 Kiemkleur: - / -  
 Bloemkleur: paars / P  
 Hoeveelheid bessen: benedengemiddeld / 6,5  
 Loof - ontwikkeling begin: snel / 8  
 Loof - ontwikkeling volledig: goed / 8  
 Loof - stevigheid plant: vrij stevig / 7  
 Loof - selecteerbaarheid: vrij makkelijk / 7  
 Schilkleur: rood / R  
 Vleeskleur: lichtgeel / 6  
 Schilhoedanigheid: bovengemiddeld / 6,5  
 Knolvorm: ovaal lang / OL  
 Regelmaat knolvorm: vrij regelmatig / 6,5  
 Knolzetting: vrij hoog / 7  
 Knolgrootte: vrij grof / 7,5  
 Regelmaat sortering: regelmatig / 7  
 Kiemrust: gemiddeld / 6

### Gevoeligheid en kwaliteit

Doorwas: redelijk gevoelig / 6,5  
 Blauwgevoeligheid: weinig tot niet gevoelig / 8  
 Groeischeuren: weinig gevoelig / 7  
 Rooibeschatting: weinig gevoelig / 7  
 Metribuzin - vóór opkomst: redelijk gevoelig / 6  
 Metribuzin - ná opkomst: weinig gevoelig / 7  
 Bentazon: - / -  
 Ethyleen: - / -  
 Onderwatergewicht: 327  
 Drogestofgehalte: 18,1%  
 Kooktype: vrij vastkokend / AB  
 Grauwverkleuring (na koken): - / -  
 Rauwverkleuring: - / -  
 Frietkwaliteit: niet geschikt / 5  
 Drogestofverdeling: - / -  
 Chipskwaliteit: - / -  
 TGA-gehalte: 8,6  
 Talent: - / -  
 Kiemrust: gemiddeld / 6

# TEELTADVIES



[www.agricopotatoes.nl](http://www.agricopotatoes.nl)

## Teeltadvies <sup>1</sup>

Stikstof: -

Fosfaat: -

Kalium: -

## Pootgoedbehandeling

Kan direct uit de koelcel geplant worden, bij voorkeur na een korte warmtestoot. Afkiemen kan een negatief effect hebben op de opbrengst en uniformiteit van de sortering.

## Plantafstand

50/55 mm: 40 cm (33.000 planten/ha)

35/55 mm: 33 cm (40.000 planten/ha)

## Onkruiden

Gebruik geen Metribuzin (Sencor). Dit geeft een ernstige loofreactie en opbrengstderving.

## Schimmels

Een strikt preventief spuitschema is noodzakelijk.

## Oogst

Wacht tenminste twee weken na loofdoding, vanwege de gevoeligheid voor rooibeschatiging en/of stootblauw.

## Bewaartemperatuur - Bewaarperiode

Geadviseerde bewaartemperatuur is 4 °C. Geschikt voor korte tot middellange bewaring.

<sup>1</sup> Bemestingsadvies is gebaseerd op bodemanalyse



## Resistenties

Virus - Bladrol: - / -

Virus - Yn: vatbaar / 5

Virus - Yntn (knol): - / -

Kringerigheid: weinig vatbaar / 6

Phytophthora loof: zeer vatbaar / 3

Phytophthora knol: weinig vatbaar / 6

Fusarium: vatbaar / 5,5

Schurft: weinig vatbaar / 6,5

Poederschurft: - / -

Virus - A: - / -

Say potato,  
say Agrico.

Virus - X: - / -

Zwarte spikkel: - / -

Erwinia: - / -

Wratziekte F1 (D1): resistent / 10

Wratziekte F6 (O1): resistent / 10

Wratziekte F18 (T1): - / -

Aardappelmoetheid Ro 1/4 (A): resistent / 9

Aardappelmoetheid Ro 2/3 (B/C): vatbaar / 4

Aardappelmoetheid Pa 2 (D): resistent / 9

Aardappelmoetheid Pa 3 (E): partieel resistent / 8