TEELTAANBEVELING

Rosalyn.

Een middenvroeg consumptieras met een mooie rode schil en een goede opbrengst.

- **Vroeg een goede opbrengst**
- **G. pallida en wratziekte resistenties**
- **Goede schurftresistentie**

Traditioneel



Karakteristieken

Algemene kenmerken

Kweker: L. Hermus & A.J. van der Linden
Kruising: AR 05-1073 x EVOLUTION
Kwekersrecht: Aangevraagd
Zaailing: HL 12-0801

Plant- en knoleigenschappen

Rijptijd: middenvroeg / 7
Kiemkleur: - / -
Bloemkleur: paars / P
Hoeveelheid bessen: benedengemiddeld / 6,5
Loof - ontwikkeling begin: snel / 8
Loof - ontwikkeling volledig: goed / 8
Loof - stevigheid plant: vrij stevig / 7
Loof - selecteerbaarheid: vrij makkelijk / 7
Schilkleur: rood / R
Vleeskleur: lichtgeel / 6
Schilhoedanigheid: bovengemiddeld / 6,5
Knolvorm: ovaal lang / OL
Regelmaat knolvorm: vrij regelmatig / 6,5
Knolzetting: vrij hoog / 7
Knolgrootte: vrij grof / 7,5
Regelmaat sortering: regelmatig / 7
Kiemrust: gemiddeld / 6

Gevoeligheid en kwaliteit

Doorwas: redelijk gevoelig / 6,5
Blauwgevoeligheid: weinig tot niet gevoelig / 8
Groeischeuren: weinig gevoelig / 7
Rooibeschadiging: weinig gevoelig / 7
Metribuzin - vóór opkomst: redelijk gevoelig / 6
Metribuzin - ná opkomst: weinig gevoelig / 7
Bentazon: - / -
Ethyleen: - / -
Onderwatergewicht: 327
Drogestofgehalte: 18,1%
Kooktype: vrij vastkokend / AB
Grauwverkleuring (na koken): - / -
Rauwverkleuring: - / -
Frietkwaliteit: niet geschikt / 5
Drogestofverdeling: - / -
Chipskwaliteit: - / -
TGA-gehalte: 8,6
Talent: - / -
Kiemrust: gemiddeld / 6

Agrico stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele schadelijke gevolgen die kunnen ontstaan bij het gebruik maken van de gegevens.

AGRICO

TEELTAANBEVELING

Teeltadvies

www.agricopotatoes.nl

Teeltadvies [1]

Stikstof: -

Fosfaat: -

Kalium: -

Pootgoedbehandeling

Kan direct uit de koelcel geplant worden, bij voorkeur na een korte warmtestoot.Afkiemen kan een negatief effect hebben op de opbrengst en uniformiteit van de sortering.

Plantafstand

50/55 mm: 40 cm (33.000 planten/ha)

35/55 mm: 33 cm (40.000 planten/ha)

Onkruiden

Gebruik geen Metribuzin (Sencor). Dit geeft een ernstige loofreactie en opbrengstderving.

Schimmels

Een strikt preventief spuitschema is noodzakelijk.

Oogst

Wacht tenminste twee weken na loofdoding, vanwege de gevoeligheid voor rooibeschadiging en/of stootblauw.

Bewaartemperatuur - Bewaarperiode

Geadviseerde bewaartemperatuur is 4 °C. Geschikt voor korte tot middellange bewaring.

[1] Bemestingsadvies is gebaseerd op bodemanalyse



Say potato, say Agrico.

Resistenties

Virus - Bladrol: - / -

Virus - Yn: vatbaar / 5

Virus - Yntn (knol): - / -

Kringerigheid: weinig vatbaar / 6

Phytophthora loof: zeer vatbaar / 3

Phytophthora knol: weinig vatbaar / 6

Fusarium: vatbaar / 5,5

Schurft: weinig vatbaar / 6,5

Poederschurft: - / -

Virus - A: - / -

Virus - X: - / -

Zwarte spikkel: - / -

Erwinia: - / -

Wratziekte F1 (D1): resistent / 10

Wratziekte F6 (O1): resistent / 10

Wratziekte F18 (T1): - / -

Aardappelmoeheid Ro 1/4 (A): resistent / 9

Aardappelmoeheid Ro 2/3 (B/C): vatbaar / 4

Aardappelmoeheid Pa 2 (D): resistent / 9

Aardappelmoeheid Pa 3 (E): partieel resistent / 8

Agrico • Duit 15 • 8305 BB Emmeloord +31 (0)527 639911 info@agrico.nl agricopotatoes.nl