

Markies.

Późna odmiana ogólnoużytkowa o wysokiej plenności do produkcji frytek, czipsów, fast foodów (sektor QSR) oraz do gotowania.



Przemysł
Frytki
Czipsy



Tradycyjny
Tradycyjne

- ▶ **Duże bulwy**
- ▶ **Odporność na wiele wirusów**
- ▶ **Dobrze się przechowuje**



Cechy charakterystyczne

Ogólne cechy charakterystyczne

Hodowca: Dr. R.J. Mansholt's Veredelingsbedrijf B.V.

Krzyżowanie: FIANNA x AGRIA

Prawa hodowcy: 31-12-2029

Sadzonka: MA 85-0698

Cechy charakterystyczne rośliny i bulwy

Dojrzałość: późna / 4

Kolor kielków: niebiesko-fioletowy / BV

Kolor kwiatów: biały / W

Liczba jagód: poniżej średniej / 6,5

Liście - rozwój początkowy: dość szybki / 7

Liście - rozwój końcowy: dobry / 8

Liście - twardość: mocne / 8

Kolor skórki: żółty / Y

Kolor miąższu: jasnożółty / 6,5

Wygląd skórki: dobry / 7

Kształt bulwy: owalno-podłużny / OL

Regularność kształtu bulwy: regularne / 7

Zawijanie bulw: średnie / 6

Wielkość bulwy: dość duża / 7,5

Regularność wielkości: regularne / 7

Okres spoczynku: średni / 6,5

Wrażliwość i jakość

Wtórna wegetacja: dość wrażliwe / 6

Czarna plamistość (uszkodzenia wewnętrzne): nieznacznie wrażliwe do niewrażliwe / 8

Pęknięcia podczas wzrostu: nieznacznie wrażliwe / 7

Uszkodzenia podczas zbioru: wrażliwe / 5

Metrybuzyna Przedwschodowo: nieznacznie wrażliwe / 7

Metrybuzyna Powschodowo: nieznacznie wrażliwe / 7

Bentazon: dość wrażliwe / 6

Etylen: 5% do 15% więcej bulw / 6

Ciężar pod wodą: 427

Zawartość suchej masy: 22,8%

Typ kulinarny: mączysty / BC

Szare przebarwienia (po ugotowaniu): dość wrażliwe / 6

Przebarwienie: nieznacznie wrażliwe / 7

Odmiana frytkowa: doskonała / 8

Rozkład suchej masy: dobry / 7,5

Odmiana czipsowa: dobra / 7

Poziom TGA: 3,4



Zalecenia uprawowe

Nawożenie ¹

Azot: standardowe zalecenie - 10%. Najlepiej w formie trzech aplikacji, z drugą dawką tuż po wytworzeniu się bulw.

Fosfor: standardowe zalecenie.

Potas: standardowe zalecenie + 10%.

Zaprawianie nasion

Prawidłowe podkiełkowanie po oderwaniu górnego kielka może dać pozytywny wynik, jeśli chodzi o wiązanie bulw. Jednorazowe obrywanie kielków jest dopuszczalne

Odległość rozsadzania

28/35 mm: 27 cm (50.000 roślin/ha)

35/55 mm: 33 cm (40.000 roślin/ha)

50/55 mm: 40 cm (33.000 roślin/ha)

Chwasty

Standardowe zastosowanie metrybuzyny (Sencor) po wzejściu może powodować pewną reakcję liści, ale rzadko prowadzi do zmniejszenia plonu.

Fungicydy

Zalecany jest harmonogram oprysków prewencyjnych przeciwko zarazie ziemniaczanej.

Zbiór

Ze względu na wyniki w zakresie wrażliwości na ciemną plamistość i/lub uszkodzenia podczas zbioru, po desykacji należy poczekać co najmniej trzy tygodnie przed zbiorami.

Temperatura przechowywania - Okres przechowywania

Zalecana temperatura przechowywania wynosi 5°C. Na potrzeby przetwarzania nie przechowywać w temperaturze poniżej 7°C. Do średnioterminowego przechowywania.



Sav potato,
Say potato,
say **Agrico.**

Odporność

Wirus - Liściozwój: nieznacznie podatne / 7

Wirus - Yn: nieznacznie podatne / 7,5

Wirus - Yntn (bulwy): nieznacznie podatne / 7

Nekrotyczne plamki: bardzo podatne / 4

Zaraza ziemniaczana - liście: nieznacznie podatne / 6,5

Zaraza ziemniaczana - bulwy: nieznacznie podatne / 7

Fusarium: nieznacznie podatne do niepodatne / 8

Parch zwykły: podatne / 5

Parch prószysty ziemniaka: bardzo podatne / 3,5

Antraknoza ziemniaka: - / -

Erwinia: podatne / 5

Rak ziemniaczany F1: - / -

Rak ziemniaczany F6: dość podatne / 5

Rak ziemniaczany F18: - / -

Mątwik ziemniaczany Ro 1/4: odporne / 9

Mątwik ziemniaczany Ro 2/3: - / -

Mątwik agresywny Pa 2: - / -

Mątwik agresywny Pa 3: - / -