

Sidney.

Wczesna odmiana, o białym miąższu, przeznaczona do produkcji frytek



**Przemysł
Frytki**

- ▮ **Duże bulwy**
- ▮ **Dobra odporność na wirusy**
- ▮ **Dobry okres spoczynku**



Cechy charakterystyczne

Ogólne cechy charakterystyczne

Hodowca: Agrico Research B.V.

Krzyżowanie: LADY ANNA x AR 05-3392

Prawa hodowcy: W toku

Sadzonka: AR 12-1680

Cechy charakterystyczne rośliny i bulwy

Dojrzałość: średnio późna / 6

Kolor kielków: - / -

Kolor kwiatów: biały / W

Liczba jagód: - / -

Liście - rozwój początkowy: dość szybki / 7

Liście - rozwój końcowy: dość dobry / 7,5

Liście - twardość: dość mocne / 7,5

Kolor skórki: żółty / Y

Kolor miąższu: biały / 4,5

Wygląd skórki: raczej słaby / 5

Kształt bulwy: podłużno-owalny / LO

Regularność kształtu bulwy: dość regularne / 6,5

Zawijanie bulw: średnie / 6

Wielkość bulwy: dość duża / 7,5

Regularność wielkości: dość regularne / 6,5

Okres spoczynku: średni / 6,5

Wrażliwość i jakość

Wtórna wegetacja: dość wrażliwe / 6,5

Czarna plamistość (uszkodzenia wewnętrzne):
nieznacznie wrażliwe / 7,5

Pęknięcia podczas wzrostu: wrażliwe / 5,5

Uszkodzenia podczas zbioru: nieznacznie wrażliwe / 7

Metrybuzyna Przedwschodowo: dość wrażliwe / 6,5

Metrybuzyna Powschodowo: dość wrażliwe / 6,5

Bentazon: - / -

Etylen: 5% mniej do 5% więcej bulw / 5

Ciężar pod wodą: 396

Zawartość suchej masy: 21,5%

Typ kulinarny: raczej mączysty / B

Szare przebarwienia (po ugotowaniu): nieznacznie
wrażliwe / 7

Przebarwienie: nieznacznie wrażliwe / 7,5

Odmiana frytkowa: powyżej średniej / 6,5

Rozkład suchej masy: doskonały / 8,5

Odmiana cipsowa: - / -

Poziom TGA: 5,5



Zalecenia uprawowe

Nawożenie ¹

Azot: standardowe zalecenie.

Fosfor: standardowe zalecenie.

Potas: standardowe zalecenie.

Zaprawianie nasion

Obrywanie kielków może mieć negatywny wpływ na regularność plonu i wielkość bulw.

Odległość rozsadzania

28/35 mm: 27 cm (50.000 plants/ha)

35/55 mm: 33 cm (40.000 plants/ha)

50/55 mm: 40 cm (33.000 plants/ha)

Chwasty

Po wzejściu nie należy stosować metrybuzyny (Sencor), ponieważ powoduje to poważną reakcję liści i prowadzi do znacznego zmniejszenia plonu.

Fungicydy

Niezbędny jest ścisły harmonogram oprysków prewencyjnych przeciwko zarazie ziemniaczanej.

Zbiór

Ze względu na wyniki w zakresie wrażliwości na ciemną plamistość i/lub uszkodzenia podczas zbioru, po desykacji należy poczekać co najmniej trzy tygodnie przed zbiorami.

Temperatura przechowywania - Okres przechowywania

Zalecana temperatura przechowywania wynosi 5°C. Na potrzeby przetwarzania nie przechowywać w temperaturze poniżej 7°C. Do średnioterminowego przechowywania.



Sav potato,
Say potato,
say **Agrico.**

Odporność

Wirus - Liściozwój: - / -

Wirus - Yn: nieznacznie podatne do niepodatne / 8

Wirus - Yntn (bulwy): - / -

Nekrotyczne plamki: nieznacznie podatne do niepodatne / 8

Zaraza ziemniaczana - liście: bardzo podatne / 4

Zaraza ziemniaczana - bulwy: nieznacznie podatne do niepodatne / 8

Fusarium: nieznacznie podatne / 6

Parch zwykły: podatne / 5,5

Parch prószysty ziemniaka: - / -

Antraknoza ziemniaka: - / -

Erwinia: - / -

Rak ziemniaczany F1: bardzo podatne* / 1*

Rak ziemniaczany F6: bardzo podatne* / 1*

Rak ziemniaczany F18: bardzo podatne* / 1*

Mątwik ziemniaczany Ro 1/4: odporne / 9

Mątwik ziemniaczany Ro 2/3: podatne / 4

R_Golden nematode Ro 5: podatne* / 4*

Mątwik agresywny Pa 2: nieznacznie podatne / 8

Mątwik agresywny Pa 3: umiarkowanie podatne / 6