

# Excellency.

Uniwersalna, średnio wczesna odmiana konsumpcyjna, z ładnie wyglądającą skórką, nadająca się do robienia domowych frytek.



**Handel  
detaliczny**  
Produkty  
świeże



**Tradycyjny**  
Tradycyjne

- ▶ **Doskonale do produkcji frytek**
- ▶ **Dobry okres spoczynku**
- ▶ **Duża zawartość suchej masy**



## Cechy charakterystyczne

### Ogólne cechy charakterystyczne

Hodowca: Agrico Research B.V.

Krzyżowanie: LADY OLYMPIA x RED ONE

Prawa hodowcy: 31-12-2042

Sadzonka: AR 98-1196

### Cechy charakterystyczne rośliny i bulwy

Dojrzałość: średnio wczesna / 6,5

Kolor kielków: czerwono-fioletowy / RV

Kolor kwiatów: biały / W

Liczba jagód: średnia / 6

Liście - rozwój początkowy: dość szybki / 7

Liście - rozwój końcowy: dość dobry / 7,5

Liście - twardość: dość mocne / 7

Kolor skórki: żółty / Y

Kolor miąższu: jasnożółty / 6

Wygląd skórki: dobry / 7

Kształt bulwy: owalno-podłużny / OL

Regularność kształtu bulwy: dość regularne / 6,5

Zawijanie bulw: średnie / 6

Wielkość bulwy: dość duża / 7

Regularność wielkości: dość regularne / 6

Okres spoczynku: średni / 6,5

### Wrażliwość i jakość

Wtórna wegetacja: dość wrażliwe / 6,5

Czarna plamistość (uszkodzenia wewnętrzne):  
nieznacznie wrażliwe / 7

Pęknięcia podczas wzrostu: nieznacznie wrażliwe / 9

Uszkodzenia podczas zbioru: wrażliwe / 5

Metrybuzyna Przedwschodowo: bardzo wrażliwe / 4

Metrybuzyna Powschodowo: bardzo wrażliwe / 4

Bentazon: wrażliwe / 5,5

Etylen: 5% mniej do 5% więcej bulw / 5

Ciężar pod wodą: 399

Zawartość suchej masy: 21,6%

Typ kulinarny: mączysty / BC

Szare przebarwienia (po ugotowaniu): nieznacznie  
wrażliwe / 7

Przebarwienie: dość wrażliwe / 6

Odmiana frytkowa: dobra / 7

Rozkład suchej masy: dobry / 7

Odmiana chipsowa: średnia / 6

Poziom TGA: 4,2



# Zalecenia uprawowe

## Nawożenie <sup>1</sup>

**Azot:** standardowe zalecenie + 10%.

**Fosfor:** standardowe zalecenie.

**Potas:** standardowe zalecenie.

## Zaprawianie nasion

Prawidłowe podkiełkowanie po oderwaniu górnego kielka może dać pozytywny wynik, jeśli chodzi o wiązanie bulw. Obrywanie kielków więcej niż jeden raz może mieć negatywny wpływ na regularność plonu i wielkość bulw.

## Odległość rozsadzania

30/50 mm: 27 cm (50.000 roślin/ha)

## Chwasty

Po wejściu nie należy stosować metrybuzyny (Sencor), ponieważ powoduje to poważną reakcję liści i prowadzi do znacznego zmniejszenia plonu.

## Fungicydy

Niezbędny jest ścisły harmonogram oprysków prewencyjnych przeciwko zarazie ziemniaczanej.

## Zbiór

Ze względu na wyniki w zakresie wrażliwości na ciemną plamistość i/lub uszkodzenia podczas zbioru, po desykacji należy poczekać co najmniej trzy tygodnie przed zbiorami.

## Temperatura przechowywania - Okres przechowywania

Zalecana temperatura przechowywania wynosi 5°C. Na potrzeby przetwarzania nie przechowywać w temperaturze poniżej 7°C. Do przechowywania długoterminowego.



Sav potato,  
Say potato,  
say **Agrico.**

## Odporność

**Wirus - Liściozwój:** - / -

**Wirus - Yn:** nieznacznie podatne / 7

**Wirus - Yntn (bulwy):** nieznacznie podatne / 7,5

**Nekrotyczne plamki:** nieznacznie podatne do niepodatne / 8

**Zaraza ziemniaczana - liście:** podatne / 5

**Zaraza ziemniaczana - bulwy:** podatne / 5

**Fusarium:** podatne / 5

**Parch zwykły:** nieznacznie podatne / 6

**Parch prószysty ziemniaka:** podatne / 5

**Antraknoza ziemniaka:** nieznacznie podatne / 6

**Erwinia:** podatne / 5

**Rak ziemniaczany F1:** odporne / 10

**Rak ziemniaczany F6:** - / -

**Rak ziemniaczany F18:** - / -

**Mątwik ziemniaczany Ro 1/4:** odporne / 9

**Mątwik ziemniaczany Ro 2/3:** - / -

**Mątwik agresywny Pa 2:** - / -

**Mątwik agresywny Pa 3:** - / -