

Arizona.

Średnio wczesna odmiana konsumpcyjna, zapewniająca duże plony w różnych warunkach klimatycznych.



- » **Wyrównany kształt i wielkość bulw**
- » **Dobra odporność na suszę**
- » **Odporność na wiele wirusów**



Cechy charakterystyczne

Ogólne cechy charakterystyczne

Hodowca: Agrico Research B.V.

Krzyżowanie: UK 150-19D22 x MASCOTTE

Prawa hodowcy: 31-12-2040

Sadzonka: AR 98-0313

Cechy charakterystyczne rośliny i bulwy

Dojrzałość: średnio wczesna / 6,5

Kolor kielków: czerwono-fioletowy / RV

Kolor kwiatów: biały / W

Liczba jagód: powyżej średniej / 5

Liście - rozwój początkowy: dość szybki / 7

Liście - rozwój końcowy: dobry / 8

Liście - twardość: średnie / 6

Kolor skórki: żółty / Y

Kolor miąższu: jasnożółty / 6

Wygląd skórki: dobry / 7

Kształt bulwy: owalny / O

Regularność kształtu bulwy: regularne / 7,5

Zawiązywanie bulw: średnie / 6

Wielkość bulwy: duża / 8

Regularność wielkości: regularne / 7

Okres spoczynku: średni / 6

Wrażliwość i jakość

Wtórna wegetacja: nieznacznie wrażliwe / 7

Czarna plamistość (uszkodzenia wewnętrzne): nieznacznie wrażliwe / 7

Pęknięcia podczas wzrostu: nieznacznie wrażliwe / 7

Uszkodzenia podczas zbioru: nieznacznie wrażliwe / 7

Metrybuzyna Przedwschodowo: wrażliwe / 5

Metrybuzyna Powschodowo: dość wrażliwe / 6,5

Bentazon: nieznacznie wrażliwe / 7

Etylen: 15% do 25% więcej bulw / 7

Ciężar pod wodą: 301

Zawartość suchej masy: 17%

Typ kulinarny: raczej zwięzły / AB

Szare przebarwienia (po ugotowaniu): dość wrażliwe / 6,5

Przebarwienie: - / -

Odmiana frytkowa: nieodpowiednia / 4

Rozkład suchej masy: - / -

Odmiana chipsowa: nieodpowiednia / 4

Poziom TGA: 4,2



Zalecenia uprawowe

Nawożenie ¹

Azot: standardowe zalecenie - 10%.

Fosfor: standardowe zalecenie.

Potas: standardowe zalecenie.

Zaprawianie nasion

Obrywanie kielków więcej niż jeden raz może mieć negatywny wpływ na regularność plonu i wielkość bulw.

Odległość rozsadzania

28/35 mm: 27 cm (50.000 roślin/ha)

35/55 mm: 30 cm (45.000 roślin/ha)

Chwasty

Po wzejściu nie należy stosować metrybuzyny (Sencor), ponieważ powoduje to poważną reakcję liści i prowadzi do znacznego zmniejszenia plonu.

Fungicydy

Niezbędny jest ścisły harmonogram oprysków prewencyjnych przeciwko zarazie ziemniaczanej.

Zbiór

Ze względu na wyniki w zakresie wrażliwości na ciemną plamistość i/lub uszkodzenia podczas zbioru, po desykacji należy czekać co najmniej dwa tygodnie przed zbiorami.

Temperatura przechowywania - Okres przechowywania

Zalecana temperatura przechowywania wynosi 4°C. Do średnioterminowego przechowywania.



Say potato,
say **Agrico.**

Odporność

Wirus - Liściszowj: - / -

Wirus - Yn: nieznacznie podatne do niepodatne / 8

Wirus - Yntn (bulwy): nieznacznie podatne do niepodatne / 8

Nekrotyczne plamki: podatne / 5

Zaraza ziemniaczana - liście: bardzo podatne / 4

Zaraza ziemniaczana - bulwy: podatne / 5

Fusarium: nieznacznie podatne / 6

Parch zwykły: podatne / 5,5

Parch prószysty ziemniaka: bardzo podatne / 2

Antraknoza ziemniaka: bardzo podatne / 4

Erwinia: nieznacznie podatne / 6

Rak ziemniaczany F1: odporne / 10

Rak ziemniaczany F6: dość podatne / 6

Rak ziemniaczany F18: - / -

Mątwik ziemniaczany Ro 1/4: odporne / 9

Mątwik ziemniaczany Ro 2/3: - / -

Mątwik agresywny Pa 2: - / -

Mątwik agresywny Pa 3: - / -