

Constance.

Średnio wczesna odmiana konsumpcyjna, z jasnożółtą skórką i o jasnożółtym kolorze miąższu.



**Handel
detaliczny**
Mycie i
pakowanie



Tradycyjny
Tradycyjne

- » **Piękny wygląd**
- » **Jednolita wielkość bulw**
- » **Dość zwięzły miąższ po ugotowaniu**



characteristics

Ogólne cechy charakterystyczne

Hodowca: J.L. Spijckman

Krzyżowanie: MARABEL x AR 93-1243

Prawa hodowcy: 31-12-2044

Sadzonka: SA 02-0020

Cechy charakterystyczne rośliny i bulwy

Dojrzałość: średnio wczesna / 7

Kolor kielków: niebiesko-fioletowy / BV

Kolor kwiatów: biały / W

Liczba jagód: średnia / 6

Liście - rozwój początkowy: dość szybki / 7

Liście - rozwój końcowy: dobry / 8

Liście - twardość: dość mocne / 7

Kolor skórki: żółty / Y

Kolor miąższu: jasnożółty / 6,5

Wygląd skórki: doskonały / 8

Kształt bulwy: owalno-okrągły / OR

Regularność kształtu bulwy: regularne / 7

Zawiązywanie bulw: średnie / 6

Wielkość bulwy: dość duża / 7

Regularność wielkości: regularne / 7

Okres spoczynku: średni / 6,5

Wrażliwość i jakość

Wtórna wegetacja: nieznacznie wrażliwe / 7

Czarna plamistość (uszkodzenia wewnętrzne):
nieznacznie wrażliwe do niewrażliwe / 8

Pęknięcia podczas wzrostu: nieznacznie wrażliwe / 7

Uszkodzenia podczas zbioru: bardzo wrażliwe / 4,5

Metrybuzyna Przedwzschodowo: nieznacznie wrażliwe / 7

Metrybuzyna Powschodowo: nieznacznie wrażliwe / 7,5

Bentazon: nieznacznie wrażliwe do niewrażliwe / 8

Etylen: 15% do 25% więcej bulw / 7

Ciężar pod wodą: 358

Zawartość suchej masy: 19,7%

Typ kulinarny: raczej zwięzły / AB

Szare przebarwienia (po ugotowaniu): dość wrażliwe / 6,5

Przebarwienie: dość wrażliwe / 6,5

Odmiana frytkowa: poniżej średniej / 5,5

Rozkład suchej masy: - / -

Odmiana czipsowa: nieodpowiednia / 4

Poziom TGA: 4,3



How to grow

Nawożenie ¹

Azot: standardowe zalecenie + 15%.

Fosfor: standardowe zalecenie.

Potas: standardowe zalecenie + 15%.

Zaprawianie nasion

Prawidłowe podkiełkowanie po oderwaniu górnego kiełka może dać pozytywny wynik, jeśli chodzi o wiązanie bulw. Obrywanie kiełków więcej niż jeden raz może mieć negatywny wpływ na regularność plonu i wielkość bulw.

Planting distance

28/35 mm: 27 cm (50.000 roślin/ha)

35/55 mm: 36 cm (37.000 roślin/ha)

Chwasty

Standardowe zastosowanie metrybuzyny (Sencor) po wejściu może powodować pewną reakcję liści, ale rzadko prowadzi do zmniejszenia plonu.

Fungicydy

Niezbędny jest ścisły harmonogram oprysków prewencyjnych przeciwko zarazie ziemniaczanej.

Zbiór

Ze względu na wyniki w zakresie wrażliwości na ciemną plamistość i/lub uszkodzenia podczas zbioru, po desykacji należy poczekać co najmniej trzy tygodnie przed zbiorami.

Temperatura przechowywania - Okres przechowywania

Zalecana temperatura przechowywania wynosi 5°C. Do średnioterminowego przechowywania.



SaSay potato,
say Agrico.

Odporność

Wirus - Liściszwój: - / -

Wirus - Yn: nieznacznie podatne do niepodatne / 8

Wirus - Yntn (bulwy): nieznacznie podatne / 6,5

Nekrotyczne plamki: nieznacznie podatne / 6

Zaraza ziemniaczana - liście: podatne / 5

Zaraza ziemniaczana - bulwy: bardzo podatne / 4,5

Fusarium: nieznacznie podatne / 6,5

Parch zwykły: nieznacznie podatne / 6

Parch prószysty ziemniaka: bardzo podatne / 3

Antraknoza ziemniaka: nieznacznie podatne / 7

Erwinia: nieznacznie podatne / 6

Rak ziemniaczany F1: - / -

Rak ziemniaczany F6: - / -

Rak ziemniaczany F18: - / -

Mątwik ziemniaczany Ro 1/4: - / -

Mątwik ziemniaczany Ro 2/3: - / -

Mątwik agresywny Pa 2: - / -

Mątwik agresywny Pa 3: - / -