ZALECENIA DOTYCZĄCE UPRAW

Constance.

Średnio wczesna odmiana konsumpcyjna, z jasnożółtą skórką i o jasnożółtym kolorze miąższu.

Handel detaliczny
Mycie i pakowanie

Tradycyjny
Tradycyjne

- **Piękny wygląd**
- **Jednolita wielkość bulw**
- **Dość zwięzły miąższ po ugotowaniu**



Cechy charakterystyczne

Ogólne cechy charakterystyczne

Hodowca: J.L. Spijkman
Krzyżowanie: MARABEL x AR 93-1243
Prawa hodowcy: 31-12-2044
Sadzonka: SA 02-0020

Cechy charakterystyczne rośliny i bulwy

Dojrzałość: średnio wczesna / 7
Kolor kiełków: niebiesko-fioletowy / BV
Kolor kwiatów: biały / W
Liczba jagód: średnia / 6
Liście – rozwój początkowy: dość szybki / 7
Liście – rozwój końcowy: dobry / 8
Liście – twardość: dość mocne / 7
Kolor skórki: żółty / Y
Kolor miąższu: jasnożółty / 6,5
Wygląd skórki: doskonały / 8
Kształt bulwy: owalno-okrągły / OR
Regularność kształtu bulwy: regularne / 7
Zawiązywanie bulw: średnie / 6
Wielkość bulwy: dość duża / 7
Regularność wielkości: regularne / 7
Okres spoczynku: średni / 6,5

Wrażliwość i jakość

Wtórna wegetacja: nieznacznie wrażliwe / 7
Czarna plamistość (uszkodzenia wewnętrzne): nieznacznie wrażliwe do niewrażliwe / 8
Pęknięcia podczas wzrostu: nieznacznie wrażliwe / 7
Uszkodzenia podczas zbioru: bardzo wrażliwe / 4,5
Metrybuzyna Przedwschodowo: nieznacznie wrażliwe / 7
Metrybuzyna Powschodowo: nieznacznie wrażliwe / 7,5
Bentazon: nieznacznie wrażliwe do niewrażliwe / 8
Etylen: 15% do 25% więcej bulw / 7
Ciężar pod woda: 358
Zawartość suchej masy: 19,7%
Typ kulinarny: raczej zwięzły / AB
Szare przebarwienia (po ugotowaniu): dość wrażliwe / 6,5
Przebarwienie: dość wrażliwe / 6,5
Odmiana frytkowa: poniżej średniej / 5,5
Rozkład suchej masy: - / -
Odmiana czipsowa: nieodpowiednia / 4
Poziom TGA: 4,3

Firma Agrico dołożyła wszelkich starań, aby stworzyć ten opis odmiany. Należy jednak pamiętać o tym, że wszelkie informacje mogą ulec zmianie, a firma Agrico nie ponosi odpowiedzialności za błędy lub pominięcia. Firma Agrico w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające lub związane z informacjami zawartymi w niniejszym opisie.

AGRICO

Zalecenia uprawowe

Nawożenie [1]

Azot: standardowe zalecenie + 15%.
Fosfor: standardowe zalecenie.
Potas: standardowe zalecenie + 15%.

Zaprawianie nasion

Prawidłowe podkiełkowanie po oderwaniu górnego kiełka może dać pozytywny wynik, jeśli chodzi o wiązanie bulw.Obrywanie kiełków więcej niż jeden raz może mieć negatywny wpływ na regularność plonu i wielkość bulw.

Odległość rozsadzania

28/35 mm: 27 cm (50.000 roślin/ha)
35/55 mm: 36 cm (37.000 roślin/ha)

Chwasty

Standardowe zastosowanie metrybuzyny (Sencor) po wzejściu może powodować pewną reakcję liści, ale rzadko prowadzi do zmniejszenia plonu.

Fungicydy

Niezbędny jest ścisły harmonogram oprysków prewencyjnych przeciwko zarazie ziemniaczanej.

Zbiór

Ze względu na wyniki w zakresie wrażliwości na ciemną plamistość i/lub uszkodzenia podczas zbioru, po desykacji należy zaczekać co najmniej trzy tygodnie przed zbiorami.

Temperatura przechowywania - Okres przechowywania

Zalecana temperatura przechowywania wynosi 5ºC. Do średnioterminowego przechowywania.

©Agrico 2022-04



Say potato, say Agrico.

Odporność

Wirus – Liściozwój: - / -
Wirus – Yn: nieznacznie podatne do niepodatne / 8
Wirus – Yntn (bulwy): nieznacznie podatne / 6,5
Nekrotyczne plamki: nieznacznie podatne / 6
Zaraza ziemniaczana – liście: podatne / 5
Zaraza ziemniaczana – bulwy: bardzo podatne / 4,5
Fusarium: nieznacznie podatne / 6,5
Parch zwykły: nieznacznie podatne / 6
Parch prószysty ziemniaka: bardzo podatne / 3
Antraknoza ziemniaka: nieznacznie podatne / 7
Erwinia: nieznacznie podatne / 6
Rak ziemniaczany F1: - / -
Rak ziemniaczany F6: - / -
Rak ziemniaczany F18: - / -
Mątwik ziemniaczany Ro 1/4: - / -
Mątwik ziemniaczany Ro 2/3: - / -
Mątwik agresywny Pa 2: - / -
Mątwik agresywny Pa 3: - / -

Agrico • Duit 15 • 8305 BB Emmeloord • The Netherlands +31 (0)527 63991 info@agrico.nl www.agricopotatoes.com