

Esmee.

Średnio wczesna odmiana konsumpcyjna, z ładnie wyglądającą czerwoną skórką, o dobrej odporności na wysokie temperatury i o dobrym plonie.

- ▶ **Piękny wygląd**
- ▶ **Duże bulwy**
- ▶ **Odporność na wiele wirusów**



**Handel
detaliczny**
Mycie i
pakowanie



Tradycyjny
Tradycyjne



Cechy charakterystyczne

Ogólne cechy charakterystyczne

Hodowca: Agrico Research B.V.

Krzyżowanie: LAURA x RODEO

Prawa hodowcy: 31-12-2043

Sadzonka: AR 01-0410

Cechy charakterystyczne rośliny i bulwy

Dojrzałość: średnio wczesna / 6,5

Kolor kielków: czerwono-fioletowy / RV

Kolor kwiatów: jasnopurpurowy / LP

Liczba jagód: bardzo wysoka / 4

Liście - rozwój początkowy: dość szybki / 7

Liście - rozwój końcowy: dość dobry / 7,5

Liście - twardość: dość mocne / 7

Kolor skórki: czerwony / R

Kolor miąższu: żółty / 7

Wygląd skórki: doskonały / 8

Kształt bulwy: owalno-podłużny / OL

Regularność kształtu bulwy: dość regularne / 6,5

Zawijanie bulw: średnie / 6

Wielkość bulwy: duża / 8

Regularność wielkości: regularne / 7

Okres spoczynku: średni / 6

Wrażliwość i jakość

Wtórna wegetacja: dość wrażliwe / 6,5

Czarna plamistość (uszkodzenia wewnętrzne):
nieznacznie wrażliwe do niewrażliwe / 8

Pęknięcia podczas wzrostu: dość wrażliwe / 6

Uszkodzenia podczas zbioru: dość wrażliwe / 6,5

Metrybuzyna Przedwschodowo: bardzo wrażliwe / 4

Metrybuzyna Powschodowo: nieznacznie wrażliwe / 7

Bentazon: nieznacznie wrażliwe / 7

Etylen: 5% mniej do 5% więcej bulw / 5

Ciężar pod wodą: 326

Zawartość suchej masy: 18%

Typ kulinarny: raczej zwięzły / AB

Szare przebarwienia (po ugotowaniu): wrażliwe / 5,5

Przebarwienie: dość wrażliwe / 6

Odmiana frytkowa: średnia / 6

Rozkład suchej masy: - / -

Odmiana czipsowa: nieodpowiednia / 4

Poziom TGA: 8,2



Zalecenia uprawowe

Nawożenie ¹

Azot: standardowe zalecenie + 10%.

Fosfor: standardowe zalecenie.

Potas: standardowe zalecenie.

Zaprawianie nasion

Można sadzić bezpośrednio po wyciągnięciu z chłodni, najlepiej po krótkim szoku termicznym. Obrywanie kielków może mieć negatywny wpływ na regularność plonu i wielkość bulw.

Odległość rozsadzania

28/35 mm: 25 cm (54.000 roślin/ha)

35/55 mm: 30 cm (45.000 roślin/ha)

Chwasty

Po wejściu nie należy stosować metrybuzyny (Sencor), ponieważ powoduje to poważną reakcję liści i prowadzi do znacznego zmniejszenia plonu.

Fungicydy

Niezbędny jest ścisły harmonogram oprysków prewencyjnych przeciwko zarazie ziemniaczanej.

Zbiór

Ze względu na wyniki w zakresie wrażliwości na ciemną plamistość i/lub uszkodzenia podczas zbioru, po desykacji należy poczekać co najmniej trzy tygodnie przed zbiorami.

Temperatura przechowywania - Okres przechowywania

Zalecana temperatura przechowywania wynosi 5°C. Do średnioterminowego przechowywania.



Say potato,
say **Agrico.**

Odporność

Wirus - Liściozwój: - / -

Wirus - Yn: nieznacznie podatne do niepodatne / 8

Wirus - Yntn (bulwy): nieznacznie podatne / 7

Nekrotyczne plamki: bardzo podatne / 4

Zaraza ziemniaczana - liście: bardzo podatne / 4,5

Zaraza ziemniaczana - bulwy: nieznacznie podatne / 7

Fusarium: nieznacznie podatne / 7

Parch zwykły: nieznacznie podatne / 6

Parch prószysty ziemniaka: nieznacznie podatne / 6,5

Antraknoza ziemniaka: podatne / 5,5

Erwinia: nieznacznie podatne / 7

Rak ziemniaczany F1: odporne / 10

Rak ziemniaczany F6: - / -

Rak ziemniaczany F18: - / -

Mątwik ziemniaczany Ro 1/4: - / -

Mątwik ziemniaczany Ro 2/3: - / -

Mątwik agresywny Pa 2: - / -

Mątwik agresywny Pa 3: - / -