

Riviera.



Tradycyjny
Tradycyjne

Średnio wczesna odmiana konsumpcyjna, z czerwoną skórką, o umiarkowanej odporności na wirusy, dobrze się przechowuje.

- ▶ **Jednolita wielkość bulw**
- ▶ **Okrągło-owalne bulwy**
- ▶ **Odporność na różne rodzaje raka ziemniaczanego**



characteristics

Ogólne cechy charakterystyczne

Hodowca: Mts. Boerhave

Krzyżowanie: MINERVA x ALCMARIA

Prawa hodowcy: 31-12-2030

Sadzonka: BH 86-0266

Cechy charakterystyczne rośliny i bulwy

Dojrzałość: bardzo wczesna / 8

Kolor kielków: niebiesko-fioletowy / BV

Kolor kwiatów: biały / W

Liczba jagód: bardzo wysoka / 4

Liście - rozwój początkowy: dość szybki / 7

Liście - rozwój końcowy: średni / 7

Liście - twardość: średnie / 6,5

Kolor skórki: żółty / Y

Kolor miąższu: jasnożółty / 6

Wygląd skórki: doskonały / 8

Kształt bulwy: owalno-okrągły / OR

Regularność kształtu bulwy: dość regularne / 6

Zawijanie bulw: dość niskie / 5

Wielkość bulwy: dość duża / 7,5

Regularność wielkości: regularne / 7

Okres spoczynku: średni / 6

Wrażliwość i jakość

Wtórna wegetacja: dość wrażliwe / 6,5

Czarna plamistość (uszkodzenia wewnętrzne): nieznacznie wrażliwe do niewrażliwe / 8

Pęknięcia podczas wzrostu: dość wrażliwe / 6,5

Uszkodzenia podczas zbioru: dość wrażliwe / 6

Metrybuzyna Przedwzschodowo: nieznacznie wrażliwe do niewrażliwe / 8

Metrybuzyna Powschodowo: nieznacznie wrażliwe do niewrażliwe / 8

Bentazon: - / -

Etylen: 5% do 15% więcej bulw / 6

Ciężar pod wodą: 318

Zawartość suchej masy: 17,7%

Typ kulinarny: raczej zwięzły / AB

Szare przebarwienia (po ugotowaniu): wrażliwe / 5,5

Przebarwienie: - / -

Odmiana frytkowa: nieodpowiednia / 4,5

Rozkład suchej masy: - / -

Odmiana chipsowa: nieodpowiednia / 4

Poziom TGA: 4,8



How to grow

Nawożenie ¹

Azot: standardowe zalecenie + 10%.

Fosfor: standardowe zalecenie.

Potas: standardowe zalecenie.

Zaprawianie nasion

Prawidłowe podkiełkowanie po oderwaniu górnego kiełka może dać pozytywny wynik, jeśli chodzi o wiązanie bulw. Obrywanie kiełków więcej niż jeden raz może mieć negatywny wpływ na regularność plonu i wielkość bulw.

Planting distance

28/35 mm: 22 cm (60.500 roślin/ha)

35/55 mm: 27 cm (50.000 roślin/ha)

Chwasty

Standardowe zastosowanie metrybuzyny (Sencor) po wejściu nie powoduje reakcji liści ani nie zmniejsza plonu.

Fungicydy

Niezbędny jest ścisły harmonogram oprysków prewencyjnych przeciwko zarazie ziemniaczanej.

Zbiór

Ze względu na wyniki w zakresie wrażliwości na ciemną plamistość i/lub uszkodzenia podczas zbioru, po desykacji należy poczekać co najmniej dwa tygodnie przed zbiorami.

Temperatura przechowywania - Okres przechowywania

Zalecana temperatura przechowywania wynosi 4°C. Do dostawy prosto z pola lub do przechowywania krótkoterminowego.



SaSay potato,
say Agrico.

Odporność

Wirus - Liściszowój: nieznacznie podatne / 7

Wirus - Yn: nieznacznie podatne do niepodatne / 8

Wirus - Yntn (bulwy): nieznacznie podatne / 7

Nekrotyczne plamki: bardzo podatne / 4

Zaraza ziemniaczana - liście: bardzo podatne / 3

Zaraza ziemniaczana - bulwy: podatne / 5

Fusarium: nieznacznie podatne / 6

Parch zwykły: podatne / 5,5

Parch prószysty ziemniaka: bardzo podatne / 2

Antraknoza ziemniaka: podatne / 5,5

Erwinia: podatne / 5

Rak ziemniaczany F1: odporne / 10

Rak ziemniaczany F6: - / -

Rak ziemniaczany F18: - / -

Mątwik ziemniaczany Ro 1/4: odporne / 9

Mątwik ziemniaczany Ro 2/3: - / -

Mątwik agresywny Pa 2: - / -

Mątwik agresywny Pa 3: - / -