Riviera.

Średnio wczesna odmiana konsumpcyjna, z czerwoną skórką, o umiarkowanej odporności na wirusy, dobrze się przechowuje.

- **Jednolita wielkość bulw**
- **Okrągło-owalne bulwy**
- **Odporność na różne rodzaje raka ziemniaczanego**

Tradycyjny
Tradycyjne



Cechy charakterystyczne

Ogólne cechy charakterystyczne

Hodowca: Mts. Boerhave
Krzyżowanie: MINERVA x ALCMARIA
Prawa hodowcy: 31-12-2030
Sadzonka: BH 86-0266

Cechy charakterystyczne rośliny i bulwy

Dojrzałość: bardzo wczesna / 8
Kolor kiełków: niebiesko-fioletowy / BV
Kolor kwiatów: biały / W
Liczba jagód: bardzo wysoka / 4
Liście – rozwój początkowy: dość szybki / 7
Liście – rozwój końcowy: średni / 7
Liście – twardość: średnie / 6,5
Kolor skórki: żółty / Y
Kolor miąższu: jasnożółty / 6
Wygląd skórki: doskonały / 8
Kształt bulwy: owalno-okrągły / OR
Regularność kształtu bulwy: dość regularne / 6
Zawiązywanie bulw: dość niskie / 5
Wielkość bulwy: dość duża / 7,5
Regularność wielkości: regularne / 7
Okres spoczynku: średni / 6

Wrażliwość i jakość

Wtórna wegetacja: dość wrażliwe / 6,5
Czarna plamistość (uszkodzenia wewnętrzne): nieznacznie wrażliwe do niewrażliwe / 8
Pęknięcia podczas wzrostu: dość wrażliwe / 6,5
Uszkodzenia podczas zbioru: dość wrażliwe / 6
Metrybuzyna Przedwschodowo: nieznacznie wrażliwe do niewrażliwe / 8
Metrybuzyna Powschodowo: nieznacznie wrażliwe do niewrażliwe / 8
Bentazon: - / -
Etylen: 5% do 15% więcej bulw / 6
Ciężar pod woda: 318
Zawartość suchej masy: 17,7%
Typ kulinarny: raczej zwięzły / AB
Szare przebarwienia (po ugotowaniu): wrażliwe / 5,5
Przebarwienie: - / -
Odmiana frytkowa: nieodpowiednia / 4,5
Rozkład suchej masy: - / -
Odmiana czipsowa: nieodpowiednia / 4
Poziom TGA: 4,8

Firma Agrico dołożyła wszelkich starań, aby stworzyć ten opis odmiany. Należy jednak pamiętać o tym, że wszelkie informacje mogą ulec zmianie, a firma Agrico nie ponosi odpowiedzialności za błędy lub pominięcia. Firma Agrico w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające lub związane z informacjami zawartymi w niniejszym opisie.

AGRICO

Zalecenia uprawowe

Nawożenie [1]

Azot: standardowe zalecenie + 10%.
Fosfor: standardowe zalecenie.
Potas: standardowe zalecenie.

Zaprawianie nasion

Prawidłowe podkiełkowanie po oderwaniu górnego kiełka może dać pozytywny wynik, jeśli chodzi o wiązanie bulw.Obrywanie kiełków więcej niż jeden raz może mieć negatywny wpływ na regularność plonu i wielkość bulw.

Odległość rozsadzania

28/35 mm: 22 cm (60.500 roślin/ha)
35/55 mm: 27 cm (50.000 roślin/ha)

Chwasty

Standardowe zastosowanie metrybuzyny (Sencor) po wzejściu nie powoduje reakcji liści ani nie zmniejsza plonu.

Fungicydy

Niezbędny jest ścisły harmonogram oprysków prewencyjnych przeciwko zarazie ziemniaczanej.

Zbiór

Ze względu na wyniki w zakresie wrażliwości na ciemną plamistość i/lub uszkodzenia podczas zbioru, po desykacji należy zaczekać co najmniej dwa tygodnie przed zbiorami.

Temperatura przechowywania - Okres przechowywania

Zalecana temperatura przechowywania wynosi 4ºC. Do dostawy prosto z pola lub do przechowywania krótkoterminowego.

©Agrico 2022-04



Say potato, say Agrico.

Odporność

Wirus – Liściozwój: nieznacznie podatne / 7
Wirus – Yn: nieznacznie podatne do niepodatne / 8
Wirus – Yntn (bulwy): nieznacznie podatne / 7
Nekrotyczne plamki: bardzo podatne / 4
Zaraza ziemniaczana – liście: bardzo podatne / 3
Zaraza ziemniaczana – bulwy: podatne / 5
Fusarium: nieznacznie podatne / 6
Parch zwykły: podatne / 5,5
Parch prószysty ziemniaka: bardzo podatne / 2

Antraknoza ziemniaka: podatne / 5,5
Erwinia: podatne / 5
Rak ziemniaczany F1: odporne / 10
Rak ziemniaczany F6: - / -
Rak ziemniaczany F18: - / -
Mątwik ziemniaczany Ro 1/4: odporne / 9
Mątwik ziemniaczany Ro 2/3: - / -
Mątwik agresywny Pa 2: - / -
Mątwik agresywny Pa 3: - / -

Agrico • Duit 15 • 8305 BB Emmeloord • The Netherlands +31 (0)527 63991 info@agrico.nl www.agricopotatoes.com