

# Rudolph.



Tradycyjny  
Tradycyjne

Średnio późna odmiana konsumpcyjna, z atrakcyjnie wyglądającą czerwoną skórką, o dobrej odporności na wysokie temperatury i o bardzo wysokim plonie.

- ▶ **Biały kolor miąższu**
- ▶ **Duże bulwy**
- ▶ **Dobrze się przechowuje**



## Cechy charakterystyczne

### Ogólne cechy charakterystyczne

Hodowca: Agrico Research B.V.

Krzyżowanie: CHIEFTAIN x STIRLING

Prawa hodowcy: 31-12-2035

Sadzonka: UK 93-1-2

### Cechy charakterystyczne rośliny i bulwy

Dojrzałość: średnio późna / 5,5

Kolor kielków: czerwono-fioletowy / RV

Kolor kwiatów: jasnopurpurowy / LP

Liczba jagód: średnia / 6

Liście - rozwój początkowy: średni / 6

Liście - rozwój końcowy: dobry / 8

Liście - twardość: mocne / 8

Kolor skórki: czerwony / R

Kolor miąższu: biały / 4

Wygląd skórki: dobry / 7

Kształt bulwy: owalno-okrągły / OR

Regularność kształtu bulwy: dość regularne / 6

Zawiązywanie bulw: dość niskie / 5

Wielkość bulwy: duża / 8

Regularność wielkości: regularne / 7

Okres spoczynku: dość długi / 7,5

### Wrażliwość i jakość

Wtórna wegetacja: dość wrażliwe / 6,5

Czarna plamistość (uszkodzenia wewnętrzne): nieznacznie wrażliwe / 7

Pęknięcia podczas wzrostu: dość wrażliwe / 6

Uszkodzenia podczas zbioru: dość wrażliwe / 6

Metrybuzyna Przedwzschodowo: nieznacznie wrażliwe do niewrażliwe / 8

Metrybuzyna Powschodowo: nieznacznie wrażliwe / 7,5

Bentazon: - / -

Etylen: 5% do 15% więcej bulw / 6

Ciężar pod wodą: 376

Zawartość suchej masy: 20,5%

Typ kulinarny: raczej zwięzły / AB

Szare przebarwienia (po ugotowaniu): dość wrażliwe / 6,5

Przebarwienie: - / -

Odmiana frytkowa: powyżej średniej / 6,5

Rozkład suchej masy: - / -

Odmiana czipsowa: poniżej średniej / 5,5

Poziom TGA: 5,5



# Zalecenia uprawowe

## Nawożenie <sup>1</sup>

**Azot:** standardowe zalecenie + 5%. Najlepiej w formie aplikacji dzielonej, z drugą dawką tuż po wytworzeniu się bulw.

**Fosfor:** standardowe zalecenie.

**Potas:** standardowe zalecenie + 10%.

## Zaprawianie nasion

Zalecany jest krótki szok termiczny lub odpowiednie podkiełkowanie. Prawidłowe podkiełkowanie po oderwaniu górnego kielka może dać pozytywny wynik, jeśli chodzi o wiązanie bulw. Jednorazowe obrywanie kielków jest dopuszczalne.

## Odległość rozsadzania

28/35 mm: 25 cm (54.000 roślin/ha)

35/55 mm: 33 cm (40.000 roślin/ha)

## Chwasty

Standardowe zastosowanie metrybuzyny (Sencor) po wzejściu może powodować pewną reakcję liści i w pewnym stopniu prowadzić do zmniejszenia plonu.

## Fungicydy

Niezbędny jest ścisły harmonogram oprysków prewencyjnych przeciwko zarazie ziemniaczanej.

## Zbiór

Ze względu na wyniki w zakresie wrażliwości na ciemną plamistość i/lub uszkodzenia podczas zbioru, po desykacji należy czekać co najmniej trzy tygodnie przed zbiorami.

## Temperatura przechowywania - Okres przechowywania

Zalecana temperatura przechowywania wynosi 5°C. Na potrzeby przetwarzania nie przechowywać w temperaturze poniżej 7°C. Do przechowywania



Say potato,  
say Agrico.  
Say potato,  
say Agrico.

## Odporność

**Wirus - Liściozwój:** - / -

**Wirus - Yn:** podatne / 5

**Wirus - Yntn (bulwy):** nieznacznie podatne / 7

**Nekrotyczne plamki:** nieznacznie podatne / 7

**Zaraza ziemniaczana - liście:** podatne / 5,5

**Zaraza ziemniaczana - bulwy:** podatne / 5,5

**Fusarium:** nieznacznie podatne / 6

**Parch zwykły:** podatne / 5

**Parch prószysty ziemniaka:** nieznacznie podatne / 7

**Antraknoza ziemniaka:** nieznacznie podatne / 7

**Erwinia:** nieznacznie podatne / 6

**Rak ziemniaczany F1:** odporne / 10

**Rak ziemniaczany F6:** umiarkowanie podatne / 8

**Rak ziemniaczany F18:** - / -

**Mątwik ziemniaczany Ro 1/4:** - / -

**Mątwik ziemniaczany Ro 2/3:** - / -

**Mątwik agresywny Pa 2:** - / -

**Mątwik agresywny Pa 3:** - / -