

Twister.

Średnio wczesna odmiana konsumpcyjna na potrzeby uprawy tradycyjnej i ekologicznej o dobrej plenności, odporna na zarazę ziemniaczaną.

- ▶ **Piękny wygląd**
- ▶ **Wysoka zdolność przechowalnicza**
- ▶ **Dość zwięzły miąższ po ugotowaniu**



Cechy charakterystyczne

Ogólne cechy charakterystyczne

Hodowca: G.W. te Winkel
 Krzyżowanie: ARG 96-0739 x AR 02-9113
 Prawa hodowcy: 31-12-2048
 Sadzonka: TW 08-1507

Cechy charakterystyczne rośliny i bulwy

Dojrzałość: średnio wczesna / 7
 Kolor kielków: czerwono-fioletowy / RV
 Kolor kwiatów: jasnopurpurowy / LP
 Liczba jagód: powyżej średniej / 5,5
 Liście - rozwój początkowy: dość szybki / 7
 Liście - rozwój końcowy: dość dobry / 7,5
 Liście - twardość: dość mocne / 7
 Kolor skórki: żółty / Y
 Kolor miąższu: jasnożółty / 6,5
 Wygląd skórki: dobry / 7
 Kształt bulwy: okrągło-owalny / RO
 Regularność kształtu bulwy: regularne / 7
 Zawiązywanie bulw: średnie / 6
 Wielkość bulwy: dość duża / 7
 Regularność wielkości: dość regularne / 6,5
 Okres spoczynku: dość długi / 7

Wrażliwość i jakość

Wtórna wegetacja: dość wrażliwe / 6,5
 Czarna plamistość (uszkodzenia wewnętrzne): nieznacznie wrażliwe do niewrażliwe / 8
 Pęknięcia podczas wzrostu: dość wrażliwe / 6,5
 Uszkodzenia podczas zbioru: nieznacznie wrażliwe / 7
 Metrybuzyna Przedwzschodowo: bardzo wrażliwe / 3
 Metrybuzyna Powschodowo: bardzo wrażliwe / 3
 Bentazon: dość wrażliwe / 6
 Etylen: 5% mniej bulw / 4
 Ciężar pod wodą: 345
 Zawartość suchej masy: 19%
 Typ kulinarny: raczej zwięzły / AB
 Szare przebarwienia (po ugotowaniu): dość wrażliwe / 6,5
 Przebarwienie: dość wrażliwe / 6
 Odmiana frytkowa: nieodpowiednia / 5
 Rozkład suchej masy: - / -
 Odmiana chipsowa: nieodpowiednia / 4
 Poziom TGA: 5,63



Zalecenia uprawowe

Nawożenie ¹

Azot: standardowe zalecenie + 20%.

Fosfor: standardowe zalecenie.

Potas: standardowe zalecenie.

Zaprawianie nasion

Można sadzić bezpośrednio po wyciągnięciu z chłodni, najlepiej po krótkim szoku termicznym. Jednorazowe obrywanie kielków jest dopuszczalne

Odległość rozsadzania

28/35 mm: 22 cm (60.500 roślin/ha)

35/50 mm: 25 cm (54.000 roślin/ha)

Chwasty

Po wejściu nie należy stosować metrybuzyny (Sencor), ponieważ powoduje to poważną reakcję liści i prowadzi do znacznego zmniejszenia plonu.

Fungicydy

Pomimo odporności na zarazę ziemniaczaną należy zwracać uwagę na ewentualne infekcje.

Zbiór

Ze względu na wyniki w zakresie wrażliwości na ciemną plamistość i/lub uszkodzenia podczas zbioru, po desykacji należy poczekać co najmniej dwa tygodnie przed zbiorami.

Temperatura przechowywania - Okres przechowywania

Zalecana temperatura przechowywania wynosi 6°C. Do przechowywania średnio- do długoterminowego.



Say potato,
say **Agrico.**

Odporność

Wirus - Liściozwój: - / -

Wirus - Yn: nieznacznie podatne do niepodatne / 8

Wirus - Yntn (bulwy): nieznacznie podatne do niepodatne / 8

Nekrotyczne plamki: nieznacznie podatne / 6

Zaraza ziemniaczana - liście: nieznacznie podatne do niepodatne / 9

Zaraza ziemniaczana - bulwy: nieznacznie podatne do niepodatne / 9

Fusarium: nieznacznie podatne / 6

Parch zwykły: nieznacznie podatne / 6

Parch prószysty ziemniaka: podatne / 5

Antraknoza ziemniaka: nieznacznie podatne / 7

Erwinia: - / -

Rak ziemniaczany F1: umiarkowanie podatne / 8

Rak ziemniaczany F6: - / -

Rak ziemniaczany F18: - / -

Mątwik ziemniaczany Ro 1/4: odporne / 9

Mątwik ziemniaczany Ro 2/3: - / -

Mątwik agresywny Pa 2: - / -

Mątwik agresywny Pa 3: - / -