

Jolene.

Średnio późna odmiana o dobrym wyglądzie skórki, nadająca się do robienia domowych frytek.


- » **Jasnożółty kolor miąższu**
- » **Nadaje się do różnych potraw**
- » **Dobra zawartość suchej masy**



**Handel
detaliczny**
Mycie i
pakowanie



**Tradycyjny
Tradycyjne**



Cechy charakterystyczne

Ogólne cechy charakterystyczne

Hodowca: Agrico Research B.V.
Krzyżowanie: SAGITTA x AR 03-1491
Prawa hodowcy: 31-12-2050
Sadzonka: AR 09-2556

Cechy charakterystyczne rośliny i bulwy

Dojrzałość: średnio późna / 6
Kolor kielków: czerwony / R
Kolor kwiatów: biały / W
Liczba jagód: poniżej średniej / 7
Liście - rozwój początkowy: dość szybki / 7,5
Liście - rozwój końcowy: dobry / 8
Liście - twardość: dość mocne / 7,5
Kolor skórki: żółty / Y
Kolor miąższu: jasnożółty / 6
Wygląd skórki: dobry / 7
Kształt bulwy: owalno-podłużny / OL
Regularność kształtu bulwy: regularne / 7
Zawijanie bulw: dość wysokie / 7
Wielkość bulwy: dość duża / 7,5
Regularność wielkości: regularne / 7
Okres spoczynku: średni / 6

Wrażliwość i jakość

Wtórna wegetacja: nieznacznie wrażliwe / 7
Czarna plamistość (uszkodzenia wewnętrzne): nieznacznie wrażliwe / 7
Pęknięcia podczas wzrostu: nieznacznie wrażliwe / 7
Uszkodzenia podczas zbioru: dość wrażliwe / 6
Metrybuzyna Przedwschodowo: dość wrażliwe / 6,5
Metrybuzyna Powschodowo: nieznacznie wrażliwe do niewrażliwe / 8
Bentazon: - / -
Etylen: 15% do 25% więcej bulw / 7
Ciężar pod wodą: 389
Zawartość suchej masy: 21,1%
Typ kulinarny: raczej mączysty / B
Szare przebarwienia (po ugotowaniu): dość wrażliwe / 6,5
Przebarwienie: nieznacznie wrażliwe / 7
Odmiana frytkowa: dobra / 7
Rozkład suchej masy: - / -
Odmiana chipsowa: nieodpowiednia / 5
Poziom TGA: -



Zalecenia uprawowe

Nawożenie ¹

Azot: standardowe zalecenie.

Fosfor: standardowe zalecenie.

Potas: standardowe zalecenie + 10%.

Zaprawianie nasion

Można sadzić bezpośrednio po wyciągnięciu z chłodni, najlepiej po krótkim szoku termicznym. Obrywanie kielków więcej niż jeden raz może mieć negatywny wpływ na regularność plonu i wielkość bulw.

Odległość rozsadzania

28/35 mm: 22 cm (60.500 roślin/ha)

35/55 mm: 25 cm (54.000 roślin/ha)

Chwasty

Standardowe zastosowanie metrybuzyny (Sencor) po wzejściu może powodować pewną reakcję liści i w pewnym stopniu prowadzić do zmniejszenia plonu.

Fungicydy

Niezbędny jest ścisły harmonogram oprysków prewencyjnych przeciwko zarazie ziemniaczanej.

Zbiór

Ze względu na wyniki w zakresie wrażliwości na ciemną plamistość i/lub uszkodzenia podczas zbioru, po desykacji należy poczekać co najmniej dwa tygodnie przed zbiorami.

Temperatura przechowywania - Okres przechowywania

Zalecana temperatura przechowywania wynosi 5°C. Do średnioterminowego przechowywania.



Say potato,
say **Agrico.**

Odporność

Wirus - Liściozwój: - / -

Wirus - Yn: nieznacznie podatne do niepodatne / 8

Wirus - Yntn (bulwy): nieznacznie podatne do niepodatne / 8

Nekrotyczne plamki: nieznacznie podatne / 6

Zaraza ziemniaczana - liście: bardzo podatne / 4

Zaraza ziemniaczana - bulwy: podatne / 5

Fusarium: nieznacznie podatne / 6

Parch zwykły: nieznacznie podatne / 6

Parch prószysty ziemniaka: nieznacznie podatne / 6,5

Antraknoza ziemniaka: nieznacznie podatne / 7,5

Erwinia: - / -

Rak ziemniaczany F1: - / -

Rak ziemniaczany F6: - / -

Rak ziemniaczany F18: - / -

Mątwik ziemniaczany Ro 1/4: - / -

Mątwik ziemniaczany Ro 2/3: - / -

Mątwik agresywny Pa 2: - / -

Mątwik agresywny Pa 3: - / -