ZALECENIA DOTYCZĄCE UPRAW

Jolene.

Średnio późna odmiana o dobrym wyglądzie skórki, nadająca się do robienia domowych frytek.

- **Jasnożółty kolor miąższu**
- **Nadaje się do różnych potraw**
- **Dobra zawartość suchej masy**

Handel detaliczny
Mycie i pakowanie

Tradycyjny
Tradycyjne



Cechy charakterystyczne

Ogólne cechy charakterystyczne

Hodowca: Agrico Research B.V.
Krzyżowanie: SAGITTA x AR 03-1491
Prawa hodowcy: 31-12-2050
Sadzonka: AR 09-2556

Cechy charakterystyczne rośliny i bulwy

Dojrzałość: średnio późna / 6
Kolor kiełków: czerwony / R
Kolor kwiatów: biały / W
Liczba jagód: poniżej średniej / 7
Liście – rozwój początkowy: dość szybki / 7,5
Liście – rozwój końcowy: dobry / 8
Liście – twardość: dość mocne / 7,5
Kolor skórki: żółty / Y
Kolor miąższu: jasnożółty / 6
Wygląd skórki: dobry / 7
Kształt bulwy: owalno-podłużny / OL
Regularność kształtu bulwy: regularne / 7
Zawiązywanie bulw: dość wysokie / 7
Wielkość bulwy: dość duża / 7,5
Regularność wielkości: regularne / 7
Okres spoczynku: średni / 6

Wrażliwość i jakość

Wtórna wegetacja: nieznacznie wrażliwe / 7
Czarna plamistość (uszkodzenia wewnętrzne): nieznacznie wrażliwe / 7
Pęknięcia podczas wzrostu: nieznacznie wrażliwe / 7
Uszkodzenia podczas zbioru: dość wrażliwe / 6
Metrybuzyna Przedwschodowo: dość wrażliwe / 6,5
Metrybuzyna Powschodowo: nieznacznie wrażliwe do niewrażliwe / 8
Bentazon: - / -
Etylen: 15% do 25% więcej bulw / 7
Ciężar pod woda: 389
Zawartość suchej masy: 21,1%
Typ kulinarny: raczej mączysty / B
Szare przebarwienia (po ugotowaniu): dość wrażliwe / 6,5
Przebarwienie: nieznacznie wrażliwe / 7
Odmiana frytkowa: dobra / 7
Rozkład suchej masy: - / -
Odmiana czipsowa: nieodpowiednia / 5
Poziom TGA: -

Firma Agrico dołożyła wszelkich starań, aby stworzyć ten opis odmiany. Należy jednak pamiętać o tym, że wszelkie informacje mogą ulec zmianie, a firma Agrico nie ponosi odpowiedzialności za błędy lub pominięcia. Firma Agrico w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające lub związane z informacjami zawartymi w niniejszym opisie.

AGRICO

Zalecenia uprawowe

Nawożenie [1]

Azot: standardowe zalecenie.

Fosfor: standardowe zalecenie.

Potas: standardowe zalecenie + 10%.

Zaprawianie nasion

Można sadzić bezpośrednio po wyciągnięciu z chłodni, najlepiej po krótkim szoku termicznym.Obrywanie kiełków więcej niż jeden raz może mieć negatywny wpływ na regularność plonu i wielkość bulw.

Odległość rozsadzania

28/35 mm: 22 cm (60.500 roślin/ha)

35/55 mm: 25 cm (54.000 roślin/ha)

Chwasty

Standardowe zastosowanie metrybuzyny (Sencor) po wzejściu może powodować pewną reakcję liści i w pewnym stopniu prowadzić do zmniejszenia plonu.

Fungicydy

Niezbędny jest ścisły harmonogram oprysków prewencyjnych przeciwko zarazie ziemniaczanej.

Zbiór

Ze względu na wyniki w zakresie wrażliwości na ciemną plamistość i/lub uszkodzenia podczas zbioru, po desykacji należy zaczekać co najmniej dwa tygodnie przed zbiorami.

Temperatura przechowywania - Okres przechowywania

Zalecana temperatura przechowywania wynosi 5°C. Do średnioterminowego przechowywania.

©Agrico 2022-04



Say potato, say Agrico.

Odporność

Wirus – Liściozwój: - / -

Wirus – Yn: nieznacznie podatne do niepodatne / 8

Wirus – Yntn (bulwy): nieznacznie podatne do niepodatne / 8

Nekrotyczne plamki: nieznacznie podatne / 6

Zaraza ziemniaczana – liście: bardzo podatne / 4

Zaraza ziemniaczana – bulwy: podatne / 5

Fusarium: nieznacznie podatne / 6

Parch zwykły: nieznacznie podatne / 6

Parch prószysty ziemniaka: nieznacznie podatne / 6,5

Antraknoza ziemniaka: nieznacznie podatne / 7,5

Erwinia: - / -

Rak ziemniaczany F1: - / -

Rak ziemniaczany F6: - / -

Rak ziemniaczany F18: - / -

Mątwik ziemniaczany Ro 1/4: - / -

Mątwik ziemniaczany Ro 2/3: - / -

Mątwik agresywny Pa 2: - / -

Mątwik agresywny Pa 3: - / -

Agrico • Duit 15 • 8305 BB Emmeloord • The Netherlands +31 (0)527 63991 info@agrico.nl www.agricopotatoes.com