

Napoleon.



Przemysł
Czipsy
Płatki

Odmiana do zbioru głównego, przeznaczona do produkcji czipsów, o jednolitej wielkości i dużej zawartości suchej masy.

- ▶ **Dobra do produkcji czipsów**
- ▶ **Odpowiednia do przetwarzania na płatki**
- ▶ **Dobra odporność na wirusy**



Cechy charakterystyczne

Ogólne cechy charakterystyczne

Hodowca: Agrico Research B.V.
Krzyżowanie: ANTINA x ALICANTE
Prawa hodowcy: 31-12-2051
Sadzonka: AR 10-4637

Cechy charakterystyczne rośliny i bulwy

Dojrzałość: późna / 5
Kolor kielków: czerwono-fioletowy / RV
Kolor kwiatów: biały / W
Liczba jagód: bardzo wysoka / 4
Liście - rozwój początkowy: dość szybki / 7
Liście - rozwój końcowy: dobry / 8
Liście - twardość: dość mocne / 7,5
Kolor skórki: żółty / Y
Kolor miąższu: jasnożółty / 6,5
Wygląd skórki: raczej słaby / 5
Kształt bulwy: okrągło-owalny / RO
Regularność kształtu bulwy: regularne / 7
Zawijanie bulw: średnie / 6
Wielkość bulwy: dość duża / 7,5
Regularność wielkości: regularne / 7
Okres spoczynku: średni / 6

Wrażliwość i jakość

Wtórna wegetacja: dość wrażliwe / 6,5
Czarna plamistość (uszkodzenia wewnętrzne): wrażliwe / 5,5
Pęknięcia podczas wzrostu: dość wrażliwe / 6
Uszkodzenia podczas zbioru: dość wrażliwe / 6,5
Metrybuzyna Przedwzrostowo: nieznacznie wrażliwe / 7
Metrybuzyna Powszchodowo: nieznacznie wrażliwe / 7
Bentazon: - / -
Etylen: 5% mniej do 5% więcej bulw / 5
Ciężar pod wodą: 450
Zawartość suchej masy: 24,1%
Typ kulinarny: mączysty / BC
Szare przebarwienia (po ugotowaniu): dość wrażliwe / 6
Przebarwienie: dość wrażliwe / 6
Odmiana frytkowa: dobra / 7
Rozkład suchej masy: dobry / 7
Odmiana czipsowa: doskonała / 8
Poziom TGA: 4,0



Zalecenia uprawowe

Nawożenie ¹

Azot: standardowe zalecenie - 10%.

Fosfor: standardowe zalecenie.

Potas: standardowe zalecenie + 20%.

Zaprawianie nasion

Prawidłowe podkiełkowanie po oderwaniu górnego kielka może dać pozytywny wynik, jeśli chodzi o wiązanie bulw.

Odległość rozsadzania

28/35 mm: 25 cm (54.000 roślin/ha)

35/55 mm: 30 cm (45.000 roślin/ha)

50/55 mm: 40 cm (33.000 roślin/ha)

Chwasty

Standardowe zastosowanie metrybuzyny (Sencor) po wejściu nie powoduje reakcji liści ani nie zmniejsza plonu.

Fungicydy

Zalecany jest harmonogram oprysków prewencyjnych przeciwko zarazie ziemniaczanej.

Zbiór

Ze względu na wyniki w zakresie wrażliwości na ciemną plamistość i/lub uszkodzenia podczas zbioru, po desykacji należy poczekać co najmniej trzy tygodnie przed zbiorami.

Temperatura przechowywania - Okres przechowywania

Na potrzeby przetwarzania nie przechowywać w temperaturze poniżej 9°C. Do przechowywania średnio- do długoterminowego.



Say potato,
say **Agrico.**

Odporność

Wirus - Liściozwój: - / -

Wirus - Yn: nieznacznie podatne do niepodatne / 8

Wirus - Yntn (bulwy): nieznacznie podatne do niepodatne / 8

Nekrotyczne plamki: podatne / 5

Zaraza ziemniaczana - liście: nieznacznie podatne / 6

Zaraza ziemniaczana - bulwy: nieznacznie podatne / 6,5

Fusarium: nieznacznie podatne / 6,5

Parch zwykły: nieznacznie podatne / 6

Parch prószysty ziemniaka: - / -

Antraknoza ziemniaka: nieznacznie podatne / 6

Erwinia: - / -

Rak ziemniaczany F1: odporne / 10

Rak ziemniaczany F6: - / -

Rak ziemniaczany F18: - / -

Mątwik ziemniaczany Ro 1/4: odporne / 9

Mątwik ziemniaczany Ro 2/3: - / -

Mątwik agresywny Pa 2: podatne / 4

Mątwik agresywny Pa 3: podatne / 2